

Contact carbapénèmase



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	Entérobactéries, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> producteurs de carbapénèmases
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect avec des objets contaminés (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Durée du portage de la bactérie productrice de carbapénèmase, de quelques semaines à plusieurs mois. Peut être prolongée en particulier chez les patients immunocompromis

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Suivi microbiologique	Admission d'un résident ayant eu un contact avec un résident porteur de EPC (CRE), en accord avec l'unité cantonale HPCI <ul style="list-style-type: none"> • contrôle de la colonisation (portage) par un frottis rectal (avec <u>matière fécale visible</u>) à J0 et J7 et J14
Placement du patient	En cas de diarrhées, sanitaires dédiés et maintien en chambre jusqu'à réception du dépistage
Durée des mesures	Selon les directives de l'unité cantonale HPCI

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct et des sanitaires Utiliser le détergent usuel pour les sols

Déchets	Élimination selon les filières habituelles
---------	--------------------------------------------

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Déclaration à l'unité cantonale HPCI
-----------------------------	--------------------------------------