

Entérocolite à *C. difficile*



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Clostridioides difficile</i> (anciennement <i>Clostridium difficile</i>) toxigénique (producteur d'entérotoxine, cytotoxine)
Réservoir	Homme, environnement
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par l'intermédiaire des mains • par l'intermédiaire d'objets contaminés par les spores • par l'environnement
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable, 1 jour à 6 semaines
Durée d'infectiosité	Variable, en principe tant que le patient est symptomatique

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT et port de GANTS lors de tout soin au résident
Placement du patient	Maintien en chambre jusqu'à 48h après disparition des diarrhées
Hygiène des mains	Gants non stériles pour tout contact avec le résident ou son environnement immédiat Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin
Matériel de soins	Réservé au résident pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à > 48h après la fin des symptômes
Transport du patient	Vêtements propres Limiter les déplacements
Circulation du patient	Maintien en chambre Eviter toute activité collective
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit Ne pas utiliser les sanitaires de la chambre Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	Privilégier l'utilisation de sanitaires dédiés (chaise percée) Demander au résident de se laver les mains avant chaque repas et après avoir été aux toilettes

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le résident (en particulier lors de la toilette) ou son environnement immédiat (en particulier lors contact potentiel avec des selles) Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	Gants non stériles pour contact avec le résident ou son environnement immédiat Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque

	soin
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels A la levée des Mesures Additionnelles <ul style="list-style-type: none"> désinfection du lit et changer la literie
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct y compris les sols des sanitaires A la levée des Mesures Additionnelles <ul style="list-style-type: none"> changement du rideau de séparation après une détersion minutieuse (détergent), procéder à désinfection minutieuse de l'environnement direct du résident (table de nuit, barrières, déambulateur, sonnette etc), y compris le sol et les sanitaires, avec une solution d'eau de Javel (hypochlorite de Na) à une concentration de 0.5% <p>En cas d'épidémie, remplacer le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien par une solution d'eau de Javel (hypochlorite de Na) à une concentration de 0.5%</p>
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Mesures en cas d'épidémie	Avertir l'unité cantonale HPCI si flambée de cas (> 1 cas durant la même semaine)
---------------------------	---