

Gale

Scabies



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Sarcoptes scabiei</i> var. <i>hominis</i>
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct prolongé entre patients • par relations sexuelles • par contact indirect, lors de manipulation de linge de corps, chemises de nuit, literie immédiatement après utilisation • la gale norvégienne est hautement contagieuse en raison d'une desquamation importante
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	<ul style="list-style-type: none"> • 2 à 6 semaines lors de primo-infection • 1 à 4 jours lors de réinfection
Durée d'infectiosité	Jusqu'à 24 à 48 h après la première dose de traitement. En cas de gale norvégienne, plusieurs traitements peuvent être nécessaires et l'infectiosité peut être prolongée

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT + GANTS
Placement du patient	Maintien en chambre
Hygiène des mains	<p><u>Gants non stériles</u> pour tout contact avec le résident ou son environnement immédiat</p> <p>Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin</p>
Signalétique	Gants à disposition devant la chambre
Matériel de soins	Réservé au résident jusqu'à 24h après 1ère dose de traitement Privilégier le matériel à usage unique
Voisins	Traitement prophylactique (traitement concomitant) des voisins de chambre sur avis de l'unité HPCI
Durée des mesures	<p>Pour la gale commune</p> <ul style="list-style-type: none"> • maintien des mesures jusqu'à 24 heures après le début du traitement (1ère dose) <p>Pour la gale norvégienne</p> <ul style="list-style-type: none"> • maintien des mesures jusqu'à la fin du traitement (2 doses) <p>Pour le traitement se référer à la recommandation Gale -Mesures en milieu de soins</p>

Transport du patient	Limitier les déplacements aux besoins essentiels durant 24h après le début du traitement
Circulation du patient	Pour la gale commune <ul style="list-style-type: none"> • maintien en chambre durant 24h après le début du traitement Pour la gale norvégienne <ul style="list-style-type: none"> • maintien en chambre jusqu'à levée des Mesures Additionnelles contact c'est-à-dire jusqu'à la fin du traitement (2 doses)
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	Le résident doit se doucher 8h après la prise d'ivermectine Une prophylaxie doit être discutée avec l'unité cantonale HPCI pour les personnes (membres du personnel, entourage du résident) ayant eu des contacts directs peau à peau avec le résident Une poignée de main n'est pas considérée comme une exposition à risque A la fin du traitement <ul style="list-style-type: none"> • lavage des vêtements et de la literie à 60°C ou mise en sac plastique fermé hermétiquement pendant 3 jours à l'extérieur ou mise en réfrigérateur durant 24h (p.ex. jouets en peluche des enfants) • Meubles rembourrés <ul style="list-style-type: none"> • Gale typique : pas de mesures • Gale norvégienne [<i>Scabies crustosa</i> (<i>S. norvegica</i>)] : passer l'aspirateur La transmission par l'intermédiaire d'objets inanimés (linge, literie) reste très limitée car les parasites meurent rapidement s'il n'y a pas de contact avec l'hôte

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le résident ou son environnement immédiat Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	Gants non stériles pour tout contact avec le résident ou son environnement immédiat Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin
Masque	Non
Mesures complémentaires	Prophylaxie post-expositionnelle recommandée pour les personnes ayant eu un contact peau à peau non protégé, s'adresser à l'unité cantonale HPCI et à la médecine du personnel Une poignée de main n'est pas considérée comme un soin à risque En présence de plus de 1 cas de gale commune ou en présence de gale

	<p>norvégienne</p> <ul style="list-style-type: none"> • traitement concomitant de tous les résidents et d'une large proportion du personnel en accord avec l'unité cantonale HPCI
--	--

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	<p>Utiliser les sacs à linge usuels Précéder à un double emballage Après 1ère dose de traitement et après 2ème dose changement de la literie et des vêtements:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavage à 60°C • le linge devant être traité à < 60°C sera gardé dans un sac hermétiquement fermé durant 3 jours puis lavé
Environnement	<p>Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct Pour le mobilier en textile (fauteuil, coussins) non lavable:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utiliser un spray acaricide (Sanytol) ou • une désinfection à la vapeur (méthode à privilégier en cas de gale norvégienne) <p>Utiliser le détergent usuel pour les sols</p>
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Mesures en cas d'épidémie	<p>En présence de plus de 1 cas de gale commune ou en présence de gale norvégienne</p> <ul style="list-style-type: none"> • traitement concomitant de tous les résidents et une large proportion du personnel, en accord avec l'Unité cantonale HPCI
---------------------------	---