

## Gonorrhée

### Epidémiologie

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Agent infectieux          | <i>Neisseria gonorrhoeae</i>   |
| Réservoir                 | Homme  |
| Mode de transmission      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• principalement par contact sexuel</li> <li>• transmission verticale mère-enfant</li> <li>• matériel infectieux: liquides biologiques, particulièrement les sécrétions vaginales et urétrales, les sécrétions oculaires</li> </ul> |
| Transmission interhumaine | Oui  |
| Période d'incubation      | 1 à 14 jours, parfois plus long  |
| Durée d'infectiosité      | Quelques heures après une antibiothérapie adéquate<br>Pendant des mois chez l'individu non traité  |

### Prise en charge du patient

|                        |   |
|------------------------|---|
| Mesures additionnelles | Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante |
| Mesures spécifiques    | Dépistage et traitement du(des) partenaire(s) sexuel(s)       |

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

|                      |   |
|----------------------|---|
| Blouse de protection | Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques |
| Gants                | Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques  |
| Masque               | Non   |