

Hépatite C



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	Virus de l'hépatite C (virus ARN)
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • dans la communauté: principalement par voie parentérale (utilisation d'aiguilles ou de matériel souillés, blessure accidentelle), autres modes plus rares (transmission verticale, transmission sexuelle) • à l'hôpital: idem
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	De 2 semaines à 6 mois, en moyenne entre 6 et 9 semaines
Durée d'infectiosité	Débute 1 à 2 semaines avant les symptômes et peut persister à vie en l'absence de traitement lors d'infection chronique

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
------------------------	---

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non
Mesures complémentaires	Toute exposition accidentelle à du sang ou des liquides biologiques doit être déclarée à la médecine du personnel

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Déclaration du médecin dans un délai d'une semaine
---------------------------------	--