

Infection invasive à pneumocoques



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> par l'intermédiaire des gouttelettes ou par des objets contaminés par des sécrétions respiratoires fraîchement émises la transmission de <i>S.pneumoniae</i> conduit le plus souvent à une colonisation mais pas à une infection. De ce fait, on ne propose pas d'isolement
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	1 à 3 jours
Durée d'infectiosité	Un traitement antibiotique par de la pénicilline permet de supprimer l'infectiosité en l'espace de 24 à 48 heures

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
------------------------	---

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du résident ceci pendant 24 heures après le début du traitement antibiotique Pas nécessaire si simple passage dans la chambre

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Déclaration du médecin dans un délai d'une semaine des maladies invasives à pneumocoques
---------------------------------	--