

Infection ou colonisation à entérobactéries non *E. coli* productrices de bêta-lactamases à spectre élargi (ESBL)



Epidémiologie

Agent infectieux	Entérobactéries autres que <i>E. coli</i> (<i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>E. cloacae</i> ...) productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (ESBL ou BLSE)
Réservoir	Homme, animaux
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable, dépend de la bactérie incriminée
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée (portage intestinal de quelques mois à plusieurs années)

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Suivi microbiologique	Selon les recommandations de l'unité cantonale HPCI
Placement du patient	Maintien en chambre durant les périodes d'incontinence fécale non contenue ou diarrhées non contenues
Voisins	En situation épidémique (>1 résident avec présence d'ESBL chez un même germe) un dépistage des voisins peut-être envisagé en accord avec l'unité cantonale HPCI
Durée des mesures	Pendant toute la durée du portage d'entérobactéries non <i>E. coli</i> productrices d'ESBL
Transport du patient	Vêtements propres (non souillés) Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
Circulation du patient	<u>Restreindre la circulation dans l'établissement et éviter les activités en groupe en présence de diarrhées</u>
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	En présence de <u>diarrhées</u> , privilégier l'utilisation de <u>sanitaires dédiés</u>
Transfert/sortie	Avertir l'unité cantonale HPCI et le service de destination pour qu'ils prennent les mesures adéquates

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projection prévisible de sang ou de liquides biologiques ou lors de
----------------------	--

	contact potentiel avec les selles
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct Utiliser le détergent usuel pour les sols
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles
Autres	Vaisselle : filière habituelle

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Déclaration à l'unité cantonale HPCI
Mesures en cas d'épidémie	En situation épidémique (>1 patient avec présence d'ESBL chez un même germe) des mesures supplémentaires doivent être envisagées sur recommandations de l'unité cantonale HPCI