

Infections à Streptocoques pyogènes du groupe A

Infections cutanées, fasciite nécrosante, syndrome de choc toxique (TSS-like), endométrite (fièvre puerpérale), pharyngite, pneumonie



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Streptococcus pyogenes</i> du groupe A
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct ou indirect (transmission manuportée). Les patients infectés ou porteurs asymptomatiques (nez, gorge, anus, vagin) peuvent être à l'origine d'infections nosocomiales ou de contamination alimentaire • transmission par des gouttelettes, particules de grosse dimension (> 5 microns), dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie • la dispersion de gouttelettes se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source • les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur • portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge) • transmission materno-foetale
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	1 à 3 jours, rarement plus
Durée d'infectiosité	<ul style="list-style-type: none"> • 24 heures après l'introduction d'un traitement antibiotique adéquat • 10 à 21 jours en l'absence de traitement pour les cas simples, plusieurs semaines à mois si lésions purulentes non traitées

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions standard est suffisante. Si plaie/écoulement difficile à contenir dans un pansement, instaurer des mesures additionnelles CONTACT lors des soins en chambre et maintien en chambre durant 24h après instauration d'un traitement antibiotique adéquat.
------------------------	---

	Si pneumonie, pharyngite, instaurer des mesures additionnelles GOUTTELETTES durant 24h après instauration d'un traitement antibiotique adéquat
Placement du patient	Maintien en chambre durant 24h après instauration d'un traitement antibiotique adéquat
Signalétique	Masque de soins à disposition pour le personnel devant la chambre. A mettre lors de soins dans un périmètre de 1-2 mètres du résident
Matériel de soins	Réservé au résident durant la durée des Mesures Additionnelles Désinfection minutieuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pression, etc) Privilégier du matériel à usage unique
Durée des mesures	24 heures après instauration d'un traitement antibiotique adéquat

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Si des Mesures Additionnelles Contact ont été instaurées, port d'une blouse de protection, si contact direct avec le résident ou son environnement immédiat, ceci pendant 24 heures après le début d'un traitement antibiotique adéquat
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Si des Mesures Additionnelles Gouttelettes ont été instaurées, port d'un masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un périmètre de 1-2 mètre du résident. Pas nécessaire si simple passage dans la chambre

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels
Environnement	Utiliser le détergent/ désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct Utiliser le détergent usuel pour les sols
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles