

Méningite à méningocoque



Gouttelettes

Epidémiologie

| | |
|---------------------------|--|
| Agent infectieux | <i>Neisseria meningitidis</i> |
| Réservoir | Homme |
| Mode de transmission | <ul style="list-style-type: none"> • transmission par des gouttelettes, particules de grosse dimension (> 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation ou certaines interventions: ex. bronchoscopie • la dispersion de gouttelettes se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source • les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur • portes d'entrée: muqueuses (nez, gorge) |
| Transmission interhumaine | Oui |
| Période d'incubation | 2 à 10 jours, en général 3 à 4 jours |
| Durée d'infectiosité | La contagiosité cesse 24 heures après le début d'un traitement antibiotique efficace |

Prise en charge du patient

| | |
|------------------------|---|
| Mesures additionnelles | GOUTTELETES |
| Placement du patient | Maintien en chambre durant 24 heures après début antibiothérapie efficace |
| Signalétique | Masque de soins à disposition pour le personnel devant la chambre. A mettre lors des soins dans un périmètre à < 2m |
| Matériel de soins | Réservé au résident pendant la durée des Mesures Additionnelles (durant 24 heures après début du traitement) Désinfection minutieuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pression, saturomètre, glucomètre, etc.) Privilégier le matériel à usage unique |
| Voisins | Enquête d'entourage et prophylaxie post-expositionnelle selon directives de l'unité cantonale HPCI, selon recommandations de l'OFSP <ul style="list-style-type: none"> • ciprofloxacine 500 mg en dose unique ou • rifampicine 2x600 mg/jour pendant 2 jours ou • ceftriaxone 1x 250 mg IM |
| Durée des mesures | Jusqu'à 24 heures après le début du traitement |
| Transport du patient | Port d'un masque de soins par le résident Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates Limiter les déplacements aux besoins essentiels |
| Circulation du patient | Maintien en chambre au moins 24 heures après le début du traitement antibiotique |

| | |
|-----------|---|
| Visiteurs | Port d'un masque de soins Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre |
|-----------|---|

Mesures de protection/prévention pour le personnel

| | |
|-------------------------|---|
| Blouse de protection | Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques |
| Gants | Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques |
| Masque | Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du résident Pas nécessaire si simple passage dans la chambre |
| Mesures complémentaires | Pour le personnel ayant eu une exposition à risque sans masque de protection (intubation, réanimation etc.), une prophylaxie post-expositionnelle est recommandée <ul style="list-style-type: none"> • ciprofloxacine 500 mg en dose unique ou • rifampicine 2x600 mg/jour pendant 2 jours • ceftriaxone 1x 250 mg IM dose unique (femmes enceintes) <p>Contactez la médecine du personnel</p> |

Nettoyage/désinfection

| | |
|-------------------|--|
| Matériel de soins | Utiliser le détergent/désinfectant usuel |
| Lit et literie | Utiliser les sacs à linge usuels |
| Environnement | Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct Utiliser le détergent usuel pour les sols A la levée des Mesures Additionnelles: <ul style="list-style-type: none"> • désinfection minutieuse de l'environnement direct du résident (table de nuit, sonnette, barrière, potence, télécommande, déambulateur, etc.) • changer le rideau de séparation |
| Déchets | Elimination des déchets selon les filières habituelles |

Documents associés

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Documents en lien | notion de base |
|-------------------|--------------------------------|

Déclaration du cas

| | |
|---------------------------------|---|
| Déclaration au service HPCI | Oui |
| Déclaration au médecin cantonal | Déclaration du médecin dans les 24 heures |
| Mesures en cas d'épidémie | Prophylaxie de l'entourage proche [personnes vivant sous le même toit, enfants fréquentant une crèche, enfants et enseignant d'une même classe (jusqu'à 2ème HarmoS), personnes ayant eu contact proche (baiser, etc.)] selon avis office du médecin cantonal |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|