

## Pneumonie à *Pneumocystis jiroveci*

### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Pneumocystis jiroveci</i> (anciennement <i>carinii</i> )
Réservoir	Homme
Mode de transmission	Probablement par voie aérienne
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Pas connue avec exactitude. Peut déjà se manifester 1 à 2 mois après le début d'une immunosuppression
Durée d'infectiosité	Inconnue

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Placement du patient	Le patient ne doit en aucun cas partager la chambre avec des patients immunocompromis tels que greffe d'organe ou de moelle, onco-hématologie, neutropénie sévère, immunosuppression médicamenteuse y compris stéroïdes, infection VIH avancée
Circulation du patient	Le patient doit éviter les contacts avec des patients immunocompromis tels que greffe d'organe ou de moelle, onco-hématologie, neutropénie sévère, immunosuppression médicamenteuse y compris stéroïdes, infection VIH avancé Eviter les lieux communs (salle à manger, salon, salle d'amination, etc)

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

### Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Déclaration obligatoire que dans le cadre du SIDA: maladie indicatrice
---------------------------------	--