

## Pneumonie à mycoplasmes



### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>transmission par des gouttelettes, particules de grosse dimension (&gt; 5 microns), dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie</li> <li>la dispersion de gouttelettes se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source</li> <li>les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur</li> <li>portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge)</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	6 à 32 jours
Durée d'infectiosité	Inconnue, probablement pendant la durée de l'infection clinique

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	GOUTTELETTES
Placement du patient	Maintien en chambre
Signalétique	Masque de soins à disposition pour le personnel devant la chambre. A mettre lors des soins dans un périmètre à < 2m
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Désinfection minutieuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pression, glucomètre, etc.) Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à guérison clinique
Transport du patient	Port d'un masque de soins par le résident Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
Circulation du patient	Maintien en chambre jusqu'à guérison clinique Limiter les déplacements aux besoins essentiels
Visiteurs	Limiter les visites Port d'un masque de soins Désinfection des mains en sortant de la chambre

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le résident ou son environnement proche
----------------------	---

	Pas nécessaire si simple passage en chambre
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du résident Pas nécessaire si simple passage dans la chambre

### Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct Utiliser le détergent usuel pour les sols A la levée des Mesures Additionnelles <ul style="list-style-type: none"> <li>désinfection minutieuse de l'environnement direct du résident (table de nuit, sonnette, barrières, potence, télécommande, etc.)</li> </ul>
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles