

Staphylocoques dorés résistants à la méticilline ou MRSA ou SARM

Infection / Colonisation



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline (MRSA, SARM)
Réservoir	Homme, rarement l'animal
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect (matériel de soins ou d'exams, instruments, environnement immédiat du patient) • par contact direct avec un animal colonisé
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée par le MRSA. Le MRSA peut survivre plusieurs jours dans l'environnement

Prise en charge du patient

Statut actuel	Actif
Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante CONTACT en présence d'une infection à MRSA autre que pulmonaire GOUTTELETES en présence d'une pneumonie à MRSA
Suivi microbiologique	Uniquement dans le cadre d'une décolonisation sur avis de l'unité cantonale HPCI
Placement du patient	Chambre individuelle ou chambre à 2 lits si le voisin n'a pas de facteur de risque (plaie) ou sur avis de l'unité cantonale HPCI Maintien en chambre si infection à MRSA
Décolonisation	Indications <ul style="list-style-type: none"> • hémodialyse, portage VRE, avant chirurgie orthopédique prothétique ou cardiaque ou sur préavis de l'unité cantonale HPCI • modalité du traitement de décolonisation
Voisins	Enquête d'entourage selon directives de l'unité cantonale HPCI <ul style="list-style-type: none"> • dépistage par frottis nez/gorge/plis périnéaux
Durée des mesures	Pendant toute la durée du portage MRSA, selon indication de l'unité cantonale HPCI
Transport du patient	Literie et chemise du résident propres Désinfection du lit Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquate
Circulation du patient	Pas de restriction de circulation et d'activités collectives en cas de

	colonisation En présence d'infection à MRSA, <u>maintien en chambre</u> jusqu'à guérison
Visiteurs	Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	Des Mesures Additionnelles CONTACT ou GOUTTELETTES doivent être instaurées en cas d'infection à MRSA Distribuer au résident le dépliant d'information "Patient porteur de MRSA"

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non, sauf si infection pulmonaire à MRSA (masque de soins)

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct Utiliser le détergent usuel pour les sols
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles
Autres	Vaisselle : filière habituelle

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----