

Toxoplasmose



Précautions
Standard

Epidémiologie

| | |
|---------------------------|---|
| Agent infectieux | <i>Toxoplasma gondii</i> (protozoaire) |
| Réservoir | Le chat, hôte définitif, excrète des oocystes dans les selles. Ce parasite peut s'enkyster dans les tissus des oiseaux et des mammifères, dont l'homme |
| Mode de transmission | <ul style="list-style-type: none"> • dans la communauté: par ingestion d'oocystes présents dans les excréments de chat (carrés de sable, caisses à chat, terre). Consommation de viande parasitée crue ou insuffisamment cuite (porc ou mouton, rarement boeuf) ou d'aliments contaminés par des oocystes présents dans les excréments de chat. • à l'hôpital: lors de transplantation d'organes solides, rarement lors de transfusion sanguines d'un donneur infecté |
| Transmission interhumaine | Non |
| Période d'incubation | De 5 à 23 jours |
| Durée d'infectiosité | Pas de transmission interhumaine, à l'exception de l'infection transplacentaire et des rares cas liés à des transfusions sanguines ou des transplantations d'organes |

Prise en charge du patient

| | |
|------------------------|---|
| Mesures additionnelles | Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante |
|------------------------|---|

Mesures de protection/prévention pour le personnel

| | |
|----------------------|---|
| Blouse de protection | Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques |
| Gants | Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques |
| Masque | Non |

Déclaration du cas

| | |
|---------------------------------|--|
| Déclaration au médecin cantonal | Chez un résident VIH positif sans diagnostic préalable de SIDA, une toxoplasmose cérébrale est un critère diagnostique de SIDA. De ce fait, la déclaration médicale est obligatoire dans un délai de 1 semaine |
|---------------------------------|--|