

Zona disséminé



Epidémiologie

Agent infectieux	Virus varicella-zoster (VZV) Zona disséminé: éruption érythémato-vésiculeuse au niveau d'un dermatome accompagnée de nombreuses vésicules (> 20) à distance du dermatome concerné
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par fines gouttelettes < 5 microns (aérosol), dont la production est exacerbée par la toux, la conversation ou l'éternuement. Elles peuvent rester en suspension dans l'air quelques heures et être transportées à distance. D'autres personnes peuvent donc s'infecter sans qu'il y ait une proximité immédiate avec le patient-source • par contact direct avec les lésions • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Réactivation
Durée d'infectiosité	Jusqu'à 7 jours ou plus si lésions actives

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT et AEROSOL pour le personnel non immun pour la varicelle Pour le personnel immun pour la varicelle : aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Placement du patient	Chambre individuelle ventilable avec sas, transfert à l'hôpital à envisager selon avis HPCI
Signalétique	Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre exigeant le port de blouse et masque ultrafiltrant FFP2 en entrant (pour le personnel non immun)
Matériel de soins	Réservé au résident pendant la durée des Mesures Additionnelles Désinfection minutieuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pression, glucomètre, etc.) Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à l'absence de nouvelles vésicules (minimum 5 jours, voire plus en cas d'immunosuppression)
Transport du patient	Port du masque de soins par le résident Vêtements propres Avertir le service transport et de destination pour qu'ils prennent les mesures adéquates Limiter les déplacements aux besoins vitaux

Circulation du patient	Maintien en chambre porte fermée pendant la durée des Mesures Additionnelles Limiter les déplacements aux besoins vitaux
Visiteurs	Les visiteurs non immuns pour la varicelle ne devraient pas entrer en contact avec les patients infectés Visite d'adultes non immuns seulement avec accord du service HPCI (port d'un masque) Pas de visite des enfants non immuns Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	Risque d'excrétion importante de virus (lésions cutanées et sécrétions respiratoires) chez les résidents immunodéprimés <ul style="list-style-type: none"> • veiller particulièrement à ce que les résidents atteints de zona disséminé n'entrent pas en contact avec d'autres résidents immunocompromis

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Personnel non immun pour la varicelle <ul style="list-style-type: none"> • oui, si contact direct avec le résident ou son environnement immédiat • pas nécessaire si simple passage dans la chambre Personnel immun <ul style="list-style-type: none"> • non, sauf si projection prévisible de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Masque FFP2, sauf pour le personnel immunisé contre la varicelle avec documentation par la médecine du personnel
Mesures complémentaires	<ul style="list-style-type: none"> • Le personnel n'ayant pas fait la varicelle ou n'ayant pas été vacciné ne devrait pas s'occuper de résidents avec zona disséminé, ceci pour éviter de s'infecter d'une part, et d'être la source de nouvelles infections d'autre part • Les femmes enceintes non immunes nécessite des mesures particulières • Le personnel non immun avec exposition au zona disséminé doit contacter immédiatement la médecine du personnel ou l'infectiologue de garde

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du résident <ul style="list-style-type: none"> • désinfection minutieuse du lit et changer la literie
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de

	<p>l'environnement direct Utiliser le détergent usuel pour les sols A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du résident</p> <ul style="list-style-type: none"> • aérer (ouvrir la fenêtre et fermer la porte) pendant 1 heure avant de procéder au nettoyage • désinfection minutieuse de l'environnement direct du résident (table de nuit, sonnette, barrières, potence, déambulateur, etc.)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----