

Brucellose

Fièvre de Malte, maladie de Bang, fièvre ondulante



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> , <i>B. suis</i> , <i>B. canis</i>
Réservoir	Bovins (<i>B. abortus</i>), chèvres, moutons (<i>B. melitensis</i>), porcs (<i>B. suis</i>), chiens (<i>B. canis</i>)
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • dans la communauté: par consommation de produits laitiers non pasteurisés ou de viande contaminée, ou contact direct avec des placentas ou des foetus d'animaux infectés • à l'hôpital: dans les laboratoires lors de manipulation de matériel infectieux (cultures)
Transmission interhumaine	Non
Période d'incubation	Entre 5 et 60 jours
Durée d'infectiosité	Pas de transmission interhumaine

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
------------------------	---

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent, désinfectant usuel pour l'entretien quotidien.
-------------------	---