

## Conjonctivite à Chlamydia


 Précautions  
Standard

### Epidémiologie

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Agent infectieux          | <i>Chlamydia trachomatis</i>   |
| Réservoir                 | Homme  |
| Mode de transmission      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans la communauté: transmission verticale (mère-enfant), sécrétions génitales c/o adulte</li> <li>• à l'hôpital: transmission directe par contact ou par l'intermédiaire d'instruments ophtalmiques insuffisamment décontaminés</li> </ul> |
| Transmission interhumaine | Oui  |
| Période d'incubation      | Chez le nouveau-né, 5 à 14 jours, chez l'adulte 6 à 19 jours   |
| Durée d'infectiosité      | Durée de l'écoulement  |

### Prise en charge du patient

|                        |   |
|------------------------|---|
| Mesures additionnelles | Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante |
|------------------------|---|

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

|                      |   |
|----------------------|---|
| Blouse de protection | Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques |
| Gants                | Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques  |
| Masque               | Non   |