

Conjonctivite virale aiguë ou hémorragique



Epidémiologie

Agent infectieux	Entérovirus, Adénovirus
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> Par contact direct avec les sécrétions oculaires ou respiratoires de personnes infectées Par contact indirect avec des objets contaminés (mains)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Entérovirus: 12h à 3 jours Adénovirus: 5 à 12 jours, en moyenne 8 jours
Durée d'infectiosité	Entérovirus: au moins 4 jours après le début des symptômes cliniques Adénovirus: au maximum 14 jours après le début des symptômes cliniques

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT
Placement du patient	Chambre individuelle
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée de la maladie Désinfection minutieuse du matériel à usage multiple (stéthoscope, brassard à pression, etc.) Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à guérison clinique
Circulation du patient	Pas de sorties de la chambre
Visiteurs	Limiter les visites (enfants) Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement direct, pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel A la levées des Mesures Additionnelles, changer le lit et la literie
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels A la

Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien. A la levées des Mesures Additionnelles ou au départ du patient: <ul style="list-style-type: none">• changement du rideau• désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, etc.)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles