

Contact VRE (Entérocoque résistant à la vancomycine)

Contact ERV ou ERG

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Enterococcus faecium</i> ou <i>faecalis</i> résistant à la vancomycine (VRE ou ERG)
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect avec des objets contaminés (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Durée du portage (très variable: de quelques semaines à plusieurs mois)

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Suivi microbiologique	<p>Afin d'exclure un portage VRE, dépistage par frottis rectal (avec <u>matière fécale visible</u>) à J0, J7 et J14</p> <p>Frottis à adresser au laboratoire d'épidémiologie du CHUV</p>
Placement du patient	<p>En chambre individuelle si possible, ceci jusqu'à réception des résultats du dépistage, ou en chambre à 2 lits en accord avec le service HPCI</p> <p>En cas de diarrhées, sanitaires dédiés et maintien en chambre jusqu'à réception du dépistage</p>

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Environnement	En présence de diarrhées, utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct et les sanitaires
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
Documentation système d'alerte	Activer l'indicateur d'isolement dans SOARIAN: mesures HPCI en psychiatrie