

Contact carbapénèmase

Epidémiologie

Agent infectieux	Entérobactéries, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> producteurs de carbapénèmases
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect avec des objets contaminés (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Durée du portage de la bactérie productrice de carbapénèmase, de quelques semaines à plusieurs mois. Peut être prolongée en particulier chez les patients immunocompromis

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Suivi microbiologique	Afin d' <u>exclure</u> un portage EPC, dépistage par frottis rectal (avec <u>matière fécale visible</u>) à J0, J7 et J14 Frottis à adresser au laboratoire d'épidémiologie du CHUV
Placement du patient	En chambre individuelle si possible, ceci jusqu'à réception des résultats du dépistage, ou en chambre à 2 lits en accord avec le service HPCI Privilégier des sanitaires individuels
Mesures spécifiques	En présence de diarrhées, utilisation de sanitaires dédiés

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Environnement	En présence de diarrhées, utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct et des sanitaires
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
Documentation système	Dans SOARIAN, activer l'indicateur d'isolement: mesures HPCI en psychiatrie



d'alerte	
----------	--