

Dermatomycose ou teigne

Dermatophyte

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Trichophyton, Microsporum et Epidermophyton</i>
Réservoir	Homme, animaux (chats et chiens)
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none">• dans la communauté: contact direct / indirect avec des personnes ou des animaux infectés• à l'hôpital: contact direct ou par l'intermédiaire d'objets (peigne, brosse) ainsi que par la contamination des sols de douche ou de piscine• matériel infectieux: lésions cutanées, cheveux, squames cutanées
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	10 à 14 jours
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps que les dermatophytes peuvent être mis en évidence dans les lésions

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Mesures spécifiques	Serviettes et linges individuels Décontamination régulière (après chaque utilisation) de la baignoire et/ou de la douche si elles sont partagées avec d'autres patients

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non