

Entérocoque résistant à la vancomycine

VRE (vancomycin-resistant Enterococcus) ou ERV (Entérocoque résistant à la vancomycine) ou ERG (Entérocoque résistant aux glycopeptides)



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Enterococcus faecium</i> ou <i>faecalis</i> résistant à la vancomycine <i>vanA</i> ou <i>vanB</i>
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect avec des objets contaminés (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Durée du portage (très variable: quelques semaines à plusieurs mois). Peut être prolongée chez un patient immunocompromis

Prise en charge du patient

Statut actuel	Actif
Mesures additionnelles	CONTACT
Suivi microbiologique	Admission d'un patient connu: frottis rectal et culture d'urine si sonde vésicale à l'admission - sauf si prélèvement déjà effectué < 30j
Placement du patient	Chambre individuelle avec sanitaires ou sanitaires dédiés
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Voisins	Enquête d'entourage selon directives du service HPCI: <ul style="list-style-type: none"> • dépistage des contacts par frottis rectal (avec matière fécale visible) à J0, J7 et J14
Durée des mesures	Pendant toute la durée du portage VRE (selon indication du service HPCI)
Transport du patient	Vêtements du patient propres Désinfection du moyen de transport (lit, chaise roulante, canne, déambulateur, etc) Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates Limiter les déplacements
Circulation du patient	Sortie de la chambre autorisée (en absence de diarrhées ou d'incontinence fécale non contenue) selon modalités suivantes: <ul style="list-style-type: none"> • habits propres, mains désinfectées

	<ul style="list-style-type: none"> pas d'utilisation de sanitaires en dehors de ceux réservés pour le patient
Visiteurs	<p>Ne pas s'asseoir sur le lit</p> <p>Désinfection des mains en sortant de la chambre</p> <p>Limiter le nombre de visiteurs</p>
Mesures spécifiques	Distribuer au patient le dépliant d'information (Patient porteur de VRE)
Transfert/sortie	Avertir le service/établissement de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates et avertir le service HPCI

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	<p>Oui, si contact direct (contact peau à peau) avec le patient ou son environnement immédiat</p> <p>Pas nécessaire si simple passage dans la chambre</p> <p>Pas nécessaire lors des soins en dehors de la chambre (physiothérapie, ergothérapie, rééducation)</p>
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non
Mesures complémentaires	En cas d'épidémie (>1 cas), prendre contact avec le service HPCI

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	<p>Utiliser les sacs à linge usuels</p> <p>A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient</p> <ul style="list-style-type: none"> désinfection minutieuse du lit et changer la literie
Environnement	<p>Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien</p> <p>A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient</p> <ul style="list-style-type: none"> changement du rideau même si le patient reste dans la même chambre désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.) et des sanitaires
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles
Autres	Vaisselle : filière habituelle

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	oui
Déclaration au médecin cantonal	Non, sauf en cas d'épidémie (>1 cas)