

Gastroentérite à norovirus

Gastroentérite à sapovirus



Contact



Gouttelettes

Epidémiologie

Agent infectieux	Norovirus (ou Norwalk-like virus) Sapovirus
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • dans la communauté: par contact direct ou indirect avec du matériel ou l'environnement contaminé, dans des rares cas par le biais d'aliments, d'eau ou de boisson contaminés • à l'hôpital: par contact direct ou indirect avec du matériel ou l'environnement contaminé, ou via dissémination de gouttelettes lors de vomissements
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	24 à 48 heures (extrêmes: 10 à 50 heures)
Durée d'infectiosité	L'agent infectieux est présent en grandes quantités dans les selles et les vomissures pendant la phase aiguë de la maladie puis encore au moins 2 jours après. La durée d'infectiosité est prolongée chez les jeunes enfants et les patients immunosupprimés

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT + GOUTTELETES en cas de vomissements
Placement du patient	<ul style="list-style-type: none"> • Patient symptomatique à l'admission : chambre individuelle • Patient symptomatique en cours d'hospitalisation : ne pas déplacer le patient de chambre, considérer les voisins de chambre comme potentiellement en incubation • En l'absence de WC mettre à disposition une chaise percée
Hygiène des mains	
Signalétique	
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Voisins	<p>Limiter la circulation du/des voisin-s asymptomatique-s en raison de la haute contagiosité</p> <p>Ne pas les placer avec d'autres patients asymptomatiques</p> <p>Désinfection des mains avant de sortir de la chambre</p>
Durée des mesures	Poursuivre les Mesures Additionnelles jusqu'à 48h minimum après la fin des

	symptômes. (Le virus sera encore excrété dans les selles après la fin des symptômes)
Transport du patient	Vêtements propres Limiter les déplacements aux besoins essentiels Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
Circulation du patient	Maintien en chambre jusqu'à 48h après la fin des symptômes
Visiteurs	Limiter les visites pendant la phase aiguë Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	
Transfert/sortie	En cas de sortie de l'hôpital, le patient doit s'abstenir de préparer des aliments tant qu'il est symptomatique. Informer l'entourage des mesures d'hygiène telles que l'hygiène des mains et de la désinfection biquotidienne des sanitaires + après chaque souillure avec l'eau de Javel 0.5%

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Oui en cas de vomissement, sinon masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient
Mesures complémentaires	Eviction immédiate de tout personnel présentant des symptômes de gastro-entérite jusqu'à 48h après la fin des symptômes

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels A la levée des Mesures Additionnelles <ul style="list-style-type: none"> • désinfection minutieuse du lit et changement de la literie Traitement du linge et des vêtements <ul style="list-style-type: none"> • lavage à $\geq 60^{\circ}\text{C}$ • si lavage à $<60^{\circ}\text{C}$ ajouter un produit désinfectant (oxygène actif ou autre désinfectant pour le textile) lors du lavage
Environnement	Désinfection chimico-mécanique immédiate de toute souillure visible avec le produit actif contre le Norovirus fourni par le service hôtelier (Tristel Fuse) Bi-quotidien:

	<ul style="list-style-type: none"> désinfection chimico-mécanique des sanitaires avec le produit actif contre le Norovirus fourni par le service hôtelier (Tristel Fuse) <p>Quotidien:</p> <ul style="list-style-type: none"> désinfection chimico-mécanique de l'environnement direct du patient avec le produit actif contre le Norovirus fourni par le service hôtelier <p>A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient</p> <ul style="list-style-type: none"> nettoyage et désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, barrières, déambulateur, sonnette, etc) y compris le sol et les sanitaires avec le produit actif contre le Norovirus fourni par le service hôtelier ou traitement de l'environnement <u>à la vapeur</u> changement du rideau de séparation
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
Documentation système d'alerte	Activer l'indicateur d'isolement dans SOARIAN
Déclaration au médecin cantonal	Non Les flambées de cas doivent être déclarées au médecin cantonal dans un délai de 1 jour
Contact/communication	Communiquer la présence de Norovirus en cas de transfert dans un autre établissement
Mesures en cas d'épidémie	<ul style="list-style-type: none"> En cas d'épidémie avérée, cohorter le personnel (le personnel attribué aux patients atteints de gastroentérite ne devra pas prendre en charge d'autres patients) Augmentation des mesures mises en place, sur avis HPCI