

Pneumonie à *Pneumocystis jiroveci*

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Pneumocystis jiroveci</i> (anciennement <i>carinii</i>)
Réservoir	Homme
Mode de transmission	Probablement par voie aérienne
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Pas connue avec exactitude. Peut déjà se manifester 1 à 2 mois après le début d'une immunosuppression
Durée d'infectiosité	Inconnue

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard en chambre individuelle est suffisante
Placement du patient	Maintien en chambre Envisager transfert en soins aigus somatiques
Durée des mesures	Jusqu'à la fin du traitement de la pneumonie à <i>Pneumocystis</i>
Transport du patient	Port d'un masque de soins pour le patient lors des déplacements dans l'hôpital pour éviter une transmission à un autre patient immunocompromis (greffe d'organe ou de moelle, onco-hématologie, neutropénie sévère, immunosuppression médicamenteuse y compris stéroïdes, SIDA)
Circulation du patient	Port d'un masque de soins pour le patient lors de déplacement Le patient doit éviter les contacts avec des patients immunocompromis tels que greffe d'organe ou de moelle, onco-hématologie, neutropénie sévère, immunosuppression médicamenteuse y compris stéroïdes, infection VIH avancé Limiter les déplacement hors de la chambre Eviter les lieux communs (salle à manger, salon, salle d'animation, etc)

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Déclaration obligatoire que dans le cadre du SIDA: maladie indicatrice
---------------------------------	--

