

Rougeole



Epidémiologie

Agent infectieux	Virus de la rougeole (famille des Paramyxovirus, genre Morbillivirus)
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> par fines gouttelettes < 5 microns (aérosols), dont la production est exacerbée par la toux, la conversation ou l'éternuement. Elles peuvent rester en suspension dans l'air quelques heures et être transportées à distance. D'autres personnes peuvent donc s'infecter sans qu'il y ait une proximité immédiate avec le patient source par contact direct avec des sécrétions nasopharyngées d'une personne infectée par l'intermédiaire du personnel (mains) par contact indirect (matériel de soins ou d'examens, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	<ul style="list-style-type: none"> médiane : 10 jours (14 jours jusqu'à l'apparition de l'exanthème) extrêmes : 7 à 21 jours
Durée d'infectiosité	De J-4 avant à J+4 après le début de l'exanthème (=J0)

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	AEROSOL
Placement du patient	Transfert du patient en soins aigus
Signalétique	Dans l'attente du transfert en soins aigus <ul style="list-style-type: none"> Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre Port de masque ultrafiltrant FFP2 pour toute personne avant d'entrer dans la chambre
Matériel de soins	Réservé jusqu'au transfert Privilégier le matériel à usage unique
Voisins	Enquête d'entourage selon directives du service HPCI
Durée des mesures	Jusqu'à 4 jours après le début de l'exanthème
Transport du patient	Port d'un masque de soins pour le patient Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates Limiter les déplacements aux besoins essentiels
Visiteurs	Les visiteurs non immuns ne devraient pas entrer en contact avec un patient avec rougeole Port de masque FFP2 Désinfection des mains en sortant de la chambre
Transfert/sortie	Mettre un masque de soins au patient

	Avertir le service de transport et de destination pour qu'ils prennent les mesures adéquates
--	--

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Masque FFP2, sauf pour le personnel immunisé contre la rougeole avec documentation par la médecine du personnel, à mettre avant l'entrée en chambre
Mesures complémentaires	Le personnel doit être vacciné (vaccin ROR 2 doses) Le personnel non immun doit éviter le contact avec des patients présentant une rougeole Le personnel non immun ayant eu un contact non protégé doit contacter immédiatement la médecine du personnel La vaccination effectuée dans les 72 heures après le contact permet de prévenir l'infection

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct Utiliser le détergent usuel pour les sols A la levée des Mesures Additionnelles ou au transfert du patient <ul style="list-style-type: none">aérer la chambre (ouvrir la fenêtre et fermer la porte) au min 1 heure ou plus si pas d'aération possible (4h-6h)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
Déclaration au médecin cantonal	Déclaration du médecin dans les 24 heures