

# Staphylocoques dorés résistants à la méticilline ou MRSA ou SARM

## Infection / Colonisation



Précautions  
Standard

### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline (MRSA, SARM)
Réservoir	Homme, rarement l'animal
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• par contact direct entre patients</li> <li>• par l'intermédiaire du personnel (mains)</li> <li>• par contact indirect (matériel de soins ou d'exams, instruments, environnement immédiat du patient)</li> <li>• par contact direct avec un animal colonisé</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée par le MRSA. Le MRSA peut survivre plusieurs jours dans l'environnement

### Prise en charge du patient

Statut actuel	Actif
Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante CONTACT en présence d'une infection à MRSA autre que pulmonaire GOUTTELETES en présence d'une pneumonie à MRSA
Suivi microbiologique	Suivi de la colonisation <ul style="list-style-type: none"> <li>• réadmission d'un patient MRSA actif: faire un dépistage (frottis nez, gorge, plis périnéaux + sites cliniques si pertinent) si dernier prélèvement effectué remonte à plus de 30 jours</li> <li>• contrôle après traitement de décolonisation</li> </ul>
Placement du patient	Privilégier la chambre individuelle en cas d'infection ou en présence de plaies Si chambre à 2 lits (éviter le partage de chambre avec un patient immunocompromis ou la présence de facteur de risque chez le voisin)
Matériel de soins	Privilégier le matériel à usage unique
Décolonisation	Indications <ul style="list-style-type: none"> <li>• hémodialyse, portage VRE, avant chirurgie orthopédique prothétique, chirurgie cardiaque ou sur préavis de l'unité cantonale HPCI</li> <li>• modalité du traitement de décolonisation</li> </ul>
Voisins	Pas d'enquête d'entourage sauf avis HPCI
Durée des mesures	Pendant toute la durée du portage MRSA (selon indication du service HPCI)
Transport du patient	Vêtements propres

	Avertir le service de destination
Circulation du patient	Pas de restriction de circulation en cas de colonisation En présence d'une infection à MRSA, maintien en chambre jusqu'à guérison
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	Distribuer au patient le dépliant d'information "Patient porteur de MRSA"

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques ou si infection à MRSA (port de blouse de protection en cas de contact avec le patient ou son environnement direct)
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non, sauf si infection pulmonaire à MRSA (masque de soins)

### Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels A la levée des mesures ou au départ du patient <ul style="list-style-type: none"> <li>désinfection minutieuse du lit et changement de la literie</li> </ul>
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien de l'environnement direct <ul style="list-style-type: none"> <li>désinfection quotidienne de l'environnement du patient</li> </ul> Utiliser le détergent usuel pour les sols A la levée des mesures /au départ du patient <ul style="list-style-type: none"> <li>changement du rideau de séparation</li> <li>désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, barrières, etc)</li> </ul>
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles
Autres	Vaisselle : filière habituelle

### Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
Documentation système d'alerte	Activer l'indicateur d'isolement dans SOARIAN