

# Syphilis

## Luès

### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Treponema pallidum</i>
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• par contact direct avec des lésions cutanées ou muqueuses au stade I et II lors de rapports sexuels oraux, anaux, ou vaginaux</li> <li>• par transmission transplacentaire</li> <li>• par contact indirect avec du matériel contaminé (possible mais exceptionnel)</li> <li>• par transfusion sanguine si donneur infecté et dans un stade précoce de la maladie</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	10 jours à 3 mois, en moyenne 3 semaines
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps que des lésions cutanées et muqueuses sont présentes. Disparition du risque de transmission 24 à 48 heures après le début d'un traitement de pénicilline

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Mesures spécifiques	Dépistage et traitement du(des) partenaire(s) sexuel(s)

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

### Déclaration du cas

Déclaration au médecin cantonal	Déclaration du médecin dans un délai de 1 semaine Les flambées de cas doivent être déclarées au médecin cantonal dans un délai de 1 jour
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------