

Zika virus


 Précautions
Standard

Epidémiologie

| | |
|---------------------------|---|
| Agent infectieux | Virus Zika (Arbovirus du genre Flavivirus) |
| Réservoir | Homme (en Afrique, dans les Amériques, en Asie et dans le Pacifique) |
| Mode de transmission | Par la piqûre de moustique <i>Aedes aegypti</i> dans les régions tropicales et subtropicales. Le moustique <i>Aedes albopictus</i> transmet également le virus et est capable d'hiberner pour survivre dans des régions aux températures plus basses. |
| Transmission interhumaine | <ul style="list-style-type: none"> • par voie sexuelle • verticale pendant la grossesse et lors de l'accouchement • par transfusion sanguine • par transplantation d'organe |
| Période d'incubation | Quelques jours après la piqûre par un moustique infecté |
| Durée d'infectiosité | Plusieurs jours à plusieurs semaines |

Prise en charge du patient

| | |
|------------------------|--|
| Mesures additionnelles | Non, l'application des Précautions Standard est suffisante |
|------------------------|--|

Mesures de protection/prévention pour le personnel

| | |
|----------------------|---|
| Blouse de protection | Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques |
| Gants | Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques |
| Masque | Non |

Déclaration du cas

| | |
|---------------------------------|---|
| Déclaration au médecin cantonal | Déclaration du médecin dans les 24 heures |
|---------------------------------|---|