

Angine à streptocoque du groupe A



Gouttelettes



Précautions
Standard

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Streptococcus pyogenes</i> du groupe A
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> par des particules de grosse dimension (> 5 microns) dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, les interventions telles que bronchoscopie, etc. Ce type de transmission se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur (gouttelettes > mains > yeux ou bouche) portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge) d'une autre personne.
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	1 à 3 jours, rarement plus
Durée d'infectiosité	Jusqu'à 24 heures après le début du traitement

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Chez l'adulte : aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante Chez le jeune enfant et le nourrisson: GOUTTELETTES
Placement du patient	Chez le jeune enfant et le nourrisson <ul style="list-style-type: none"> chambre individuelle, si pas de chambre individuelle disponible, délimiter le périmètre d'isolement
Signalétique	Chez le jeune enfant et le nourrisson <ul style="list-style-type: none"> affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre blouses/ masques de soins devant la chambre ou dans la chambre aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter le périmètre d'isolement avant intervention chirurgicale, communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles
Matériel de soins	Chez le jeune enfant ou le nourrisson <ul style="list-style-type: none"> réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à 24 heures après l'instauration du traitement antibiotique adéquat
Transport du patient	Chez le jeune enfant et le nourrisson <ul style="list-style-type: none"> port d'un masque de soins par le patient literie et chemise du patient propres

	<ul style="list-style-type: none"> • avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates • limiter les déplacements aux besoins essentiels
Visiteurs	<p>Chez le jeune enfant et le nourrisson</p> <ul style="list-style-type: none"> • port d'un masque de soins • ne pas s'asseoir sur le lit • désinfection des mains en sortant de la chambre

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	<p>Chez le jeune enfant et le nourrisson</p> <ul style="list-style-type: none"> • blouse lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient • pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	<p>Chez le jeune enfant et le nourrisson</p> <ul style="list-style-type: none"> • masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient • pas nécessaire si simple passage dans la chambre

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	<p>Utiliser les sacs à linge usuels</p> <p>Chez le jeune enfant ou le nourrisson, à la levée des Mesures Additionnelles ou au départ</p> <ul style="list-style-type: none"> • changer le lit et la literie
Environnement	<p>Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien</p> <p>Chez le jeune enfant ou le nourrisson, à la levée des Mesures Additionnelles ou au départ</p> <ul style="list-style-type: none"> • changement du rideau même si le patient reste dans la même chambre • désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles