

## Anthrax cutané

### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Bacillus anthracis</i>
Réservoir	Environnement, animaux contaminés (laine, cuir)
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dans la communauté: par contact cutané direct avec des animaux malades ou des produits d'animaux contaminés, viande contaminée</li> <li>• à l'hôpital: possible dans de rares cas par contact direct avec des lésions cutanées</li> </ul>
Transmission interhumaine	En principe pas de transmission interhumaine. De rares cas de transmission interhumaine après contact direct avec les lésions cutanées ont été décrits
Période d'incubation	1 à 7 jours, possible jusqu'à 60 jours

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante  CONTACT en présence de lésions cutanées avec écoulement non contenu par un pansement
Placement du patient	Chambre individuelle si mesures additionnelles CONTACT

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non
Mesures complémentaires	En cas de contact direct avec les lésions cutanées, s'adresser à la médecine du personnel

### Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
Déclaration au médecin cantonal	Déclaration du médecin par téléphone dans les 2 heures