

## Deratomyose ou teigne

### Dermatophyte

#### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Trichophyton, Microsporum et Epidermophyton</i>
Réservoir	Homme, animaux (chats et chiens)
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dans la communauté: contact direct / indirect avec des personnes ou des animaux infectés</li> <li>• à l'hôpital: contact direct ou par l'intermédiaire d'objets (peigne, brosse) ainsi que par la contamination des sols de douche ou de piscine</li> <li>• matériel infectieux: lésions cutanées, cheveux, squames cutanées</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	10 à 14 jours
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps que les dermatophytes peuvent être mis en évidence dans les lésions

#### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Mesures spécifiques	Serviettes et linges individuels, désinfection de la baignoire et/ou de la douche après chaque utilisation si elles sont partagées avec d'autres patients

#### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non