

Entérocolite à *C. difficile*



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Clostridioides difficile</i> (anciennement <i>Clostridium difficile</i>) toxigénique (producteur d'entérotoxine, cytotoxine)
Réservoir	Homme, environnement
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par l'intermédiaire des mains • par l'intermédiaire d'objets contaminés par les spores • par l'environnement
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable, 1 jour à 6 semaines
Durée d'infectiosité	Variable, en principe tant que le patient est symptomatique

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT + GANTS
Placement du patient	Chambre individuelle pour patient fortement symptomatique ou incontinent. Cohortage possible (placer plusieurs patients ayant le même agent infectieux dans la même chambre)
Hygiène des mains	<u>Gants non stériles pour tout contact</u> avec le patient ou son environnement immédiat Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin
Signalétique	Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre Blouses / gants devant la chambre ou dans la chambre Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif le périmètre d'isolement Avant intervention chirurgicale, communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles
Matériel de soins	Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles <ul style="list-style-type: none"> • Privilégier le matériel à usage unique (UU) • Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement
Durée des mesures	Jusqu'à > 48h après la fin des symptômes Pour les patients immunocompromis <ul style="list-style-type: none"> • maintenir les Mesures Additionnelles 48h après la fin du traitement de l'entérocolite
Transport du patient	Literie et chemise du patient propres Désinfection du lit Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

	Limitier les déplacements aux besoins essentiels
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	Privilégier l'utilisation de sanitaires dédiés (chaise percée) Demander au patient de se laver les mains avant chaque repas et après avoir été aux toilettes

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	<u>Gants non stériles pour contact</u> avec le patient ou son environnement immédiat Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient <ul style="list-style-type: none"> • changer le lit et la literie
Environnement	S'assurer de l'efficacité du produit désinfectant contre le pathogène en question Lors de la levée des mesures ou au départ du patient : <ul style="list-style-type: none"> • le matériel déposé dans un périmètre > à 2 m sera conservé (boites de gants, masques, etc.) sauf en cas de souillures visibles • le matériel présent dans un périmètre < à 2 m (environnement proche du patient) sera jeté • Tout le matériel désinfectable présent en chambre sera désinfecté • Les rideaux ou parois de séparation sont changés ou désinfectés respectivement
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----