

Entérocolite à *C. difficile*



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Clostridioides difficile</i> (anciennement <i>Clostridium difficile</i>) toxigénique (producteur d'entérotoxine, cytotoxine)
Réservoir	Homme, environnement
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par l'intermédiaire des mains • par l'intermédiaire d'objets contaminés par les spores • par l'environnement
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable, 1 jour à 6 semaines
Durée d'infectiosité	Variable, en principe tant que le patient est symptomatique

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT + GANTS
Suivi microbiologique	
Placement du patient	Chambre individuelle pour patient fortement symptomatique ou incontinent. Cohortage possible (placer plusieurs patients ayant le même agent infectieux dans la même chambre)
Hygiène des mains	<u>Gants non stériles pour tout contact</u> avec le patient ou son environnement immédiat Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin
Signalétique	Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre Blouses /gants devant la chambre ou dans la chambre Aux soins intensifs/continus, si pas de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif le périmètre d'isolement Avant intervention chirurgicale, communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à > 48h après la fin des symptômes Pour les patients immunocompromis <ul style="list-style-type: none"> • maintenir les Mesures Additionnelles 48h après la fin du traitement de l'entérocolite
Transport du patient	Literie et chemise du patient propres Désinfection du lit Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates Limiter les déplacements aux besoins essentiels
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit

	Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	Privilégier l'utilisation de sanitaires dédiés (chaise percée) Demander au patient de se laver les mains avant chaque repas et après avoir été aux toilettes

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	<u>Gants non stériles pour contact</u> avec le patient ou son environnement immédiat Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient <ul style="list-style-type: none"> changer le lit et la literie
Environnement	Préférer l'utilisation d'un désinfectant efficace contre le <i>Clostridium difficile</i> ou utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien selon le type de surfaces A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient <ul style="list-style-type: none"> changement du rideau même si le patient reste dans la même chambre après une détersion (détergent), désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc) y compris le sol et les sanitaires avec <u>une solution d'eau de Javel 0.5%</u> ou utiliser un détergent/désinfectant à base d'acide peracétique ou désinfection à la vapeur avec peroxyde d'hydrogène En cas d'épidémie, remplacer le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien par une solution d'eau de Javel (hypochlorite de Na) à une concentration de 0.5%
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----