

# Gale

## Scabies



Contact

### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Sarcoptes scabiei</i> var. <i>hominis</i>
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• par contact direct prolongé entre patients</li> <li>• par relations sexuelles</li> <li>• par contact indirect, lors de manipulation de linge de corps, chemises de nuit, literie immédiatement après utilisation</li> <li>• la gale norvégienne est hautement contagieuse en raison d'une desquamation importante</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 à 6 semaines lors de primo-infection</li> <li>• 1 à 4 jours lors de réinfection</li> </ul>
Durée d'infectiosité	Jusqu'à 24 à 48 h après la première dose de traitement. En cas de gale norvégienne, plusieurs traitements peuvent être nécessaires et l'infectiosité peut être prolongée

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT+ GANTS
Placement du patient	Chambre individuelle souhaitable. Cohortage possible (placer plusieurs patients ayant le même agent infectieux dans la même chambre)
Hygiène des mains	<u>Gants non stériles</u> pour tout contact avec le patient ou son environnement immédiat Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin.
Signalétique	Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre Blouses et gants devant la chambre ou dans la chambre Aux soins intensifs/continus, en absence de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif le périmètre d'isolement
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Jusqu'à 24 heures après le début du traitement pour la gale commune Jusqu'à la fin du traitement (2 doses) pour la gale norvégienne  Pour le traitement se référer à la recommandation <a href="#">Gale - Prise en charge en milieux de soins</a>
Transport du patient	Literie et chemise du patient propres Désinfection du lit

	Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates Limiter les déplacements aux besoins essentiels
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	<p>Le patient doit se doucher 8h après la prise d'ivermectine Une prophylaxie doit être discutée avec l'unité cantonale HPCI pour les personnes (membres du personnel, entourage du patient) ayant eu des contacts directs peau à peau avec le patient Une poignée de main n'est pas considérée comme une exposition à risque A la fin du traitement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavage des vêtements et de la literie à 60°C ou mise en sac plastique fermé hermétiquement pendant 3 jours à l'extérieur ou mise en réfrigérateur durant 24h (p.ex. jouets en peluche des enfants)</li> </ul> <p>Meubles rembourrés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gale typique : pas de mesures</li> <li>• Gale norvégienne [Scabies crustosa (S. norvegica)] : passer l'aspirateur</li> </ul> <p>La transmission par l'intermédiaire d'objets inanimés (linge, literie) reste très limitée car les parasites meurent rapidement s'il n'y a pas de contact avec l'hôte</p>

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	<b>Gants</b> non stériles pour contact avec le patient ou son environnement immédiat Changement de gants et lavage des mains à l'eau et au savon entre chaque soin
Masque	Non
Mesures complémentaires	<p>Prophylaxie post-expositionnelle recommandée pour les personnes ayant eu un contact peau à peau non protégé; s'adresser au service HPCI et à la médecine du personnel Une poignée de main n'est pas considérée comme un soin à risque En présence de plus de 1 cas de gale commune ou en présence de gale norvégienne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• traitement concomitant de tous les patients du service et une large proportion du personnel, en accord avec l'unité cantonale HPCI</li> </ul>

### Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels

	<p>Après la 1ère dose de traitement et en fin de traitement (2 doses)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• changement de la literie et des vêtements</li> <li>• lavage à 60°C</li> <li>• le linge ne pouvant être lavé à 60°C sera conservé 3 jours dans un sac hermétique puis lavé</li> </ul>
Environnement	<p>Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• changement du rideau de séparation, même si le patient reste dans la même chambre</li> <li>• désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)</li> </ul>
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles

### Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----