

## Gastroentérite à Yersinia



Contact



Précautions  
Standard

### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Yersinia enterocolitica</i> et <i>Yersinia pseudotuberculosis</i>
Réservoir	Animal ( <i>Y. enterocolitica</i> : principalement le porc. <i>Y. pseudotuberculosis</i> : oiseaux et mammifères sauvages)
Mode de transmission	Transmission féco-orale par ingestion d'aliments contaminés (porc mal cuit) ou d'eau contaminée, ou par contact direct avec des personnes ou des animaux infectés. <i>Y. enterocolitica</i> peut se multiplier dans le réfrigérateur
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	3 à 7 jours (<10 jours)
Durée d'infectiosité	Excrétion fécale pendant toute la durée des symptômes, habituellement 2 à 3 semaines, exceptionnellement 2 à 3 mois en l'absence de traitement

### Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante Instaurer des Mesures additionnelles CONTACT si patient avec incontinence fécale ou non compliant au mesures d'hygiène de base ou si épidémie
Placement du patient	Chambre individuelle si mesures additionnelles de CONTACT

### Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

### Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui, si instauration de Mesures additionnelles CONTACT
-----------------------------	--