

Herpès simplex virus (HSV)



Epidémiologie

Agent infectieux	Virus Herpes simplex de type 1 ou 2
Réservoir	Homme
Mode de transmission	Dans la communauté: HSV-1, principalement par la salive HSV-2, principalement par voie sexuelle, risque d'infection néonatale si la mère présente une infection au niveau génital (réactivation)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	2 à 12 jours
Durée d'infectiosité	Jusqu'à 7 semaines après la guérison apparente en cas de primo-infection et 4 à 7 jours en cas de réactivation

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante Instaurer des Mesures Additionnelle Contact si lésions disséminées
Suivi microbiologique	Chambre individuelle si Mesures Additionnelles CONTACT
Placement du patient	Chambre individuelle si Mesures Additionnelles CONTACT

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui, si Mesures Additionnelles (Herpès disséminé)
-----------------------------	---