

Infection ou colonisation à entérobactéries non *E. coli* productrices de bêta-lactamases à spectre élargi (ESBL)



Epidémiologie

Agent infectieux	Entérobactéries autres que <i>E. coli</i> (<i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>E. cloacae</i> ...) productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (ESBL ou BLSE)
Réservoir	Homme, animaux
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct entre patients • par l'intermédiaire du personnel (mains) • par contact indirect (matériel de soins ou d'examen, instruments, environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable, dépend de la bactérie incriminée
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée (portage intestinal de quelques mois à plusieurs années)

Prise en charge du patient

Statut actuel	Actif
Mesures additionnelles	CONTACT
Suivi microbiologique	Réadmission d'un patient connu <ul style="list-style-type: none"> • à l'admission, si dernier prélèvement remonte à plus de 30 jours, faire un dépistage par frottis rectal et culture d'urine si sonde • si résultat du dépistage est négatif et fait sans antibiotique, faire un 2ème dépistage (ceci à plus de 6 jours d'intervalle) • si résultat du 2ème dépistage est négatif: <u>levée des mesures mais maintien du cas dans la base d'alerte</u>
Placement du patient	Chambre individuelle (chambre à 2 lits avec délimitation du périmètre peut être envisagée si le patient n'a pas de diarrhées ou de plaie non contenue)
Signalétique	Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre Blouses devant la chambre ou dans la chambre Aux soins intensifs/continus, en absence de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif le périmètre d'isolement Avant intervention chirurgicale, communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Pendant toute la durée du portage d'entérobactéries non <i>E. coli</i> productrices d'ESBL (selon indication du service HPCI)
Transport du patient	Literie et chemise du patient propres

	Désinfection du lit Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates Limiter les déplacements aux besoins essentiels
Circulation du patient	En principe pas de sortie de la chambre Si sortie jugée nécessaire par le médecin en charge et en accord avec le service HPCI (rééducation, long séjour, etc.): <ul style="list-style-type: none"> chemise propre, flacon de poche de solution hydro-alcoolique
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient <ul style="list-style-type: none"> changer le lit et la literie
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient <ul style="list-style-type: none"> changement du rideau de séparation, même si le patient reste dans la même chambre désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.)
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles
Autres	Vaisselle : filière habituelle

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----