

Infections à Streptocoques pyogènes du groupe A

Infections cutanées, fasciite nécrosante, syndrome de choc toxique (TSS-like),
endométrite (fièvre puerpérale), pharyngite, pneumonie



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Streptococcus pyogenes</i> du groupe A
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • par contact direct ou indirect (transmission manuportée). Les patients infectés ou porteurs asymptomatiques (nez, gorge, anus, vagin) peuvent être à l'origine d'infections nosocomiales ou de contamination alimentaire • transmission par des gouttelettes, particules de grosse dimension (> 5 microns), dont la production est exacerbée par la toux, la conversation, certaines interventions: ex. bronchoscopie • la dispersion de gouttelettes se limite à un rayon de 1 à 2 mètres depuis la source • les mains ou les gants contaminés par les gouttelettes peuvent aussi être un vecteur • portes d'entrée: muqueuses (bouche, nez, gorge) • transmission materno-foetale
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	1 à 3 jours, rarement plus
Durée d'infectiosité	<ul style="list-style-type: none"> • 24 heures après l'introduction d'un traitement antibiotique adéquat • 10 à 21 jours en l'absence de traitement pour les cas simples, plusieurs semaines à mois si lésions purulentes non traitées

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	<p>Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante.</p> <p>Si plaie et/ou écoulement difficile à contenir par un pansement ou si infection invasive sévère, instaurer des mesures additionnelles CONTACT.</p> <p>Si pharyngite, pneumonie, scarlatine, instaurer des mesures Additionnelles</p>
------------------------	---

	GOUTTELETTES.
Placement du patient	Chambre individuelle si Mesures Additionnelles GOUTTELETTES/CONTACT
Signalétique	Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre Blouses / masques de soins devant la chambre ou dans la chambre. aux soins intensifs/continus, en absence de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif le périmètre d'isolement. Avant intervention chirurgicale, communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles
Matériel de soins	Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles. Privilégier du matériel à usage unique.
Durée des mesures	24 heures après l'introduction d'une antibiothérapie efficace.
Transport du patient	Port d'un masque de soins par le patient Literie et chemise du patient propres Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
Visiteurs	Port d'un masque de soins Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	Ces mesures s'appliquent uniquement en cas d'infection invasives à Streptocoques

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat; pas nécessaire pour un simple passage en chambre
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Masque de soins lorsque le travail s'effectue dans un rayon de 1 à 2 mètres du patient. Pas nécessaire pour un simple passage en chambre.

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent /désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels. A la levée des Mesures additionnelles ou au départ du patient: <ul style="list-style-type: none"> changer le lit et la literie.
Environnement	Utiliser le détergent /désinfectant usuel A la levée des mesures additionnelles ou au départ du patient: <ul style="list-style-type: none"> changement du rideau même si le patient reste dans la même chambre désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc)
Déchets	Élimination des déchets selon les filières habituelles

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----