

Lèpre

Maladie de Hansen

Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Mycobacterium leprae</i>
Réservoir	Homme
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> probablement lors de contact étroit et prolongé avec des sécrétions nasales d'une personne infectée
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	De 9 mois à 20 ans, en moyenne 4 ans
Durée d'infectiosité	Jusqu'à quelques jours après le début d'un traitement

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Aucune, l'application des Précautions Standard est suffisante
Mesures spécifiques	Les personnes ayant vécu en contact étroit avec des patients lépreux doivent être examinés cliniquement. Cet examen doit être répété annuellement pendant 5 ans

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Non, sauf si projections prévisibles de sang ou de liquides biologiques
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
Mesures en cas d'épidémie	Les personnes ayant vécu en contact étroit avec des patients lépreux doivent être examinées cliniquement Cet examen doit être répété annuellement pendant 5 ans