

Nouveau coronavirus CoVID-19

Infection à CoVID-19 confirmée ou suspecte



Gouttelettes

Epidémiologie

Agent infectieux	Virus SARS-CoV-2
Réservoir	Animal
Mode de transmission	Par contact étroit et par voie respiratoire
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	En moyenne 3 à 7 jours, extrêmes de 2 à 14 jours
Durée d'infectiosité	Jusqu'à guérison

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	Mise en place de Mesures Additionnelles Gouttelettes y compris pour la prise en charge ambulatoire (service d'urgences, policliniques et permanences)
Suivi microbiologique	Frottis naso-pharyngé à la recherche de CoVID-19.
Placement du patient	En chambre individuelle dans la mesure du possible ou cohortage
Signalétique	Affiche sur la porte à l'extérieur (MAG).
Matériel de soins	Privilégier le matériel à usage unique. Le matériel de soins pouvant être retraité est réservé au patient jusqu'à exclusion du diagnostic ou pendant toute la durée d'isolement.
Durée des mesures	Maintien des mesures au moins 10 jours après début des symptômes et 48 h sans symptômes
Transport du patient	En ambulance <ul style="list-style-type: none"> Faire porter un masque de soins (type II ou IIR) au patient. Port d'un masque de soins par le soignant qui accompagne le patient à l'arrière du véhicule. Respect des Précautions Standard par le personnel du véhicule médicalisé, en particulier respect des 5 indications à l'hygiène des mains ! Entre deux transports, procéder au nettoyage du véhicule selon les recommandations habituelles (si utilisation d'un brumisateurselon les recommandations du fournisseur).
Circulation du patient	Confinement en chambre.
Visiteurs	Limiter les visites Port d'un masque de soins Désinfection des mains avant d'entrer dans la chambre et <u>à la sortie de la chambre</u>
Mesures spécifiques	se référer à la Recommandation CoVID-19
Transfert/sortie	Mettre un masque de soins (type II ou IIR) au patient lors de transfert.

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient et son environnement proche.
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques.
Masque	Masque de soins à mettre avant d'entrer dans le box/chambre.
Mesures complémentaires	<p>En cas d'acte invasif (ex. intubation, bronchoscopie) ou de manœuvre de réanimation. <i>Les prélèvements pour dépistage ne nécessite pas de masque FFP2, le masque de soins suffit.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Masque ultrafiltrant FFP2 • Lunettes de protection • Surblouse lors de tout contact avec le patient et son environnement direct • gants à UU non stériles <p>Personnel ayant eu un contact non protégé avec un patient COVID-19 confirmé:</p> <ul style="list-style-type: none"> • port d'un masque de soins durant toute l'activité professionnel durant 14 jours • auto-contrôle (température et signes cliniques) durant 14 jours • si apparition signe clinique: stop activité et dépistage COVID-19

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le désinfectant usuel
Lit et literie	Changement de la literie au départ du patient ou à la levée des mesures Désinfection minutieuse du lit et de l'environnement
Environnement	<p>Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien. au transfert du patient:</p> <ul style="list-style-type: none"> • changement du rideau • désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, statif, perfusomat, etc.).
Déchets	Utiliser la filière habituelle

Documents associés

Documents en lien	Recommandations CoV19 - Prise en charge d'un patient suspect d'infection à coronavirus CoV-19
-------------------	---

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui.
-----------------------------	------

<p>Déclaration au médecin cantonal</p>	<p>Les médecins déclarent au service du médecin cantonal (infectionsdeclarations@hin.ch) et à l'OFSP (formulaire) dans les 24h :</p> <p>- les résultats cliniques de personnes hospitalisées avec:</p> <ul style="list-style-type: none">• CoVID-19 confirmé en laboratoire par PCR• ou critères cliniques et une imagerie par CT-Scan compatible avec CoVID-19 et PCR négative sans autre étiologie• ou critères cliniques et épidémiologiques et PCR négative sans autre étiologie <p>- les résultats cliniques des personnes décédées (formulaire décès OFSP) avec:</p> <ul style="list-style-type: none">• CoVID-19 confirmé en laboratoire par PCR• ou critères cliniques et imagerie par CT-scan compatible avec CoVID-19• critères cliniques et épidémiologiques
--	--