

Pseudomonas aeruginosa multirésistant



Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> multiresistant: souche résistante à au moins un antibiotique dans au moins 3 classes d'antibiotiques habituellement efficaces (aminosides, carbapénèmes, céphalosporines anti- <i>Pseudomonas</i> , fluoroquinolones anti- <i>Pseudomonas</i> , piperacilline/tazobactam, Aztreonam, Fosfomycine, Colistine)
Réservoir	<ul style="list-style-type: none"> environnement (sol, eau), à l'hôpital en particulier les siphons des lavabos et réservoirs d'eau
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> par contact direct entre patients par l'intermédiaire du personnel (mains) par l'intermédiaire du matériel de soins ou d'exams, d'instruments, de l'environnement immédiat)
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps qu'une personne est infectée par le <i>Pseudomonas aeruginosa</i> multiresistant

Prise en charge du patient

Mesures additionnelles	CONTACT + GOUTTELETTES si infection respiratoire
Placement du patient	Chambre individuelle
Signalétique	Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre Blouses devant la chambre ou dans la chambre Aux soins intensifs/continus, en absence de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif le périmètre d'isolement Avant intervention chirurgicale, communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles
Matériel de soins	Réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles Privilégier le matériel à usage unique
Durée des mesures	Pendant la durée de l'infection
Transport du patient	Literie et chemise du patient propres Désinfection du lit Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates Limiter les déplacements aux besoins essentiels Masque de soins pour le patient <u>si infection/colonisation des voies respiratoires</u>

Circulation du patient	En principe, pas de sortie de la chambre Si sortie jugée nécessaire par le médecin en charge et en accord avec le service HPCI (rééducation, long séjour, etc): <ul style="list-style-type: none"> chemise propre, flacon de poche de solution hydro-alcoolique
Visiteurs	Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre

Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient et son environnement immédiat Pas nécessaire pour un simple passage dans la chambre
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non, sauf si infection pulmonaire (masque de soins)

Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient <ul style="list-style-type: none"> changer le lit et la literie
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien A la levée des Mesures Additionnelles ou au départ du patient <ul style="list-style-type: none"> changement du rideau de séparation, même si le patient reste dans la même chambre désinfection minutieuse de l'environnement direct du patient (table de nuit, perfusomat, statif, etc.)
Déchets	Élimination des déchets selon les filières habituelles
Autres	Vaisselle : filière habituelle

Déclaration du cas

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----