

# Staphylocoques dorés résistants à la méticilline ou MRSA ou SARM

## Infection / Colonisation



### Epidémiologie

Agent infectieux	<i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline (MRSA, SARM)
Réservoir	Homme, rarement l'animal
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• par contact direct entre patients</li> <li>• par l'intermédiaire du personnel (mains)</li> <li>• par contact indirect (matériel de soins ou d'exams, instruments, environnement immédiat du patient)</li> <li>• par contact direct avec un animal colonisé</li> </ul>
Transmission interhumaine	Oui
Période d'incubation	Variable
Durée d'infectiosité	Aussi longtemps qu'une personne est infectée ou colonisée par le MRSA. Le MRSA peut survivre plusieurs jours dans l'environnement

### Prise en charge du patient

Statut actuel	ACTUEL
Mesures additionnelles	CONTACT  + GOUTTELETTES si infection respiratoire
Suivi microbiologique	<p>Suivi de la colonisation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• réadmission d'un patient MRSA actuel (=actif)</li> <li>• contrôle après traitement de décolonisation</li> </ul> <p>Prélèvements</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• faire un dépistage (frottis nez, gorge, plis périnéaux + sites cliniques si pertinent)</li> <li>• Si 1er set négatif fait sans antibiotique, faire un 2ème set 48h après le 1er dépistage</li> </ul>
Placement du patient	Chambre individuelle (chambre à 2 lits avec délimitation du périmètre peut être envisagée si le patient n'a pas de facteurs de risque)
Signalétique	<p>Affiche sur la porte à l'extérieur de la chambre</p> <p>Blouses +/- masques de soins si infection respiratoire devant la chambre ou dans la chambre</p> <p>Aux soins intensifs/continus, en absence de box disponible, délimiter avec du ruban adhésif le périmètre d'isolement</p> <p>Avant intervention chirurgicale, communiquer au bloc opératoire les Mesures Additionnelles</p>

Matériel de soins	Le matériel de soins est réservé au patient pendant la durée des Mesures Additionnelles <ul style="list-style-type: none"> <li>• Privilégier le matériel à usage unique (UU)</li> <li>• Prévoir un stock de matériel à UU pour 24h uniquement</li> </ul>
Décolonisation	Indications <ul style="list-style-type: none"> <li>• hémodialyse, portage VRE, avant chirurgie orthopédique avec implant ou chirurgie cardiaque ou selon indication du service HPCI</li> <li>• <a href="#">modalité et traitement de décolonisation</a></li> </ul>
Voisins	A dépister : voisins de chambre si cas index nosocomial ou durée de voisinage > 72h  Enquête d'entourage selon directives du service HPCI <ul style="list-style-type: none"> <li>• dépistage par frottis nez/gorge/plis périnéaux</li> </ul>
Durée des mesures	Pendant toute la durée du portage MRSA (selon indication du service HPCI)
Transport du patient	Literie et chemise du patient propres Désinfection du lit Avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates
Circulation du patient	En principe pas de sortie de la chambre Si sortie jugée nécessaire par le médecin en charge et en accord avec le service HPCI (rééducation, long séjour, etc.): <ul style="list-style-type: none"> <li>• chemise propre, flacon de poche de solution hydro-alcoolique</li> </ul> Maintien en chambre si <u>infection à MRSA</u>
Visiteurs	Port de masque si infection respiratoire Ne pas s'asseoir sur le lit Désinfection des mains en sortant de la chambre
Mesures spécifiques	Distribuer au patient le dépliant d'information "Patient porteur de MRSA"
Transfert/sortie	Lors d'un transfert, avertir le service d'accueil et le service HPCI

## Mesures de protection/prévention pour le personnel

Blouse de protection	Oui, si contact direct avec le patient ou son environnement immédiat Pas nécessaire si simple passage dans la chambre
Gants	Non, sauf si risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques
Masque	Non, sauf si infection pulmonaire à MRSA (masque de soins)

## Nettoyage/désinfection

Matériel de soins	Utiliser le détergent/désinfectant usuel
Lit et literie	Utiliser les sacs à linge usuels Au départ du patient <ul style="list-style-type: none"> <li>• changer le lit et la literie</li> </ul>
Environnement	Utiliser le détergent/désinfectant usuel pour l'entretien quotidien

	<p>Lors de la levée des mesures ou au départ du patient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le matériel déposé dans un périmètre &gt; à 2 m sera conservé (boites de gants, masques, etc.) sauf en cas de souillures visibles</li> <li>• le matériel présent dans un périmètre &lt; à 2 m (environnement proche du patient) sera jeté</li> <li>• Tout le matériel désinfectable présent en chambre sera désinfecté</li> <li>• Les rideaux ou parois de séparation sont changés ou désinfectés respectivement</li> </ul>
Déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles
Autres	Vaisselle : filière habituelle

**Déclaration du cas**

Déclaration au service HPCI	Oui
-----------------------------	-----