

Hémodialyse - BMR -- Dépistage à l'admission y compris transfert des patients à risque d'être porteurs de bactéries multirésistantes

Fonctions concernées : médecins et personnel infirmier des services d'hémodialyse

Pathogènes	Sites de prélèvement
MRSA : <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la pénicilline	Nez, gorge, plis inguinaux (pool) (3 frottis pouvant être poolés) Frottis ano-rectal (1 frottis pour VRE et 1 frottis pour ESBL et EPC) ; s'assurer de la présence de matière fécale sur le frottis (à rechercher sur avis HPCI)
VRE : Entérocoque résistant à la vancomycine (<i>E. faecium</i> , <i>E. faecalis</i>)	
ESBL : Entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi	
CRE=EPC : Entérobactéries productrices de carbapénémase	
Autre BMR : autre bactérie Gram nég avec carbapénémase ou autre résistance	

Mesures à instaurer : **PS** = Précautions Standard ; **MAC** = Mesures Additionnelles contact; **MAG** = MA gouttelettes si infection respiratoire

Indications au dépistage Tout patient pris en charge en hémodialyse et :	Bactéries à rechercher (dépistage)				Mesures à l'admission en hémodialyse	
	MRSA	ESBL non <i>E.coli</i>	VRE	EPC/CRE	PS et Bonnes pratiques d'injection (BPJ)	MA contact* (gouttelettes)* <small>*Isolement géographique</small>
transféré d'un établissement de soins à l'étranger (hors Suisse) ou d'un hôpital Suisse en épidémie	X	X	X	X		X
hospitalisé >24h à l'étranger dans les 12 mois qui précèdent	X	X	X	X		X
séances d'hémodialyse dans un centre étranger dans les 12 mois précédant	x	x	x	x		X
en provenance d'un programme humanitaire de l'étranger	X	X	X	X		X
avec Alerte Informatique à l'admission	Appliquer les mesures et effectuer les dépistages figurant sur l'Alerte					

Résultats dépistages	Positifs pour MRSA, ESBL non- <i>E.coli</i> , CRE, VRE, autre BMR	Négatifs
- En hémodialyse :	Appliquer les MA contact (+ MA gouttelettes si infection respiratoire) et aviser l'inf. HPCI	Précautions Standard + BPJ