

GESTION DE LA PANDEMIE COVID-19 AU NIVEAU HPCI DANS LES EMS

PRISE EN CHARGE

Lors de toute nouvelle admission : instaurer un confinement* en chambre individuelle durant 14 jours. La durée peut être discutée au cas par cas, en accord avec HPCI Vaud.

*Confinement: : Maintien du résident en chambre + Précautions Standards + Sortie encadrée par le personnel (port de masque, distanciation sociale)

Résident SANS infection à CoVID-19	Résident AVEC infection à CoVID-19	≥ 2 résidents CoVID-19 CONFIRMÉS
<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>Port de masque de soins obligatoire</u> lors d'activité de soins ▶ Renforcer l'application des Précautions Standard par les professionnels de soins ▶ Renforcer l'<u>hygiène des mains</u> des résidents ▶ Respecter les <u>mesures de distanciation sociale</u> (selon recommandations OFSP) ▶ Mettre en évidence les affiches officielles sur la prévention de l'infection à CoVID-19 ▶ Anticiper : <ul style="list-style-type: none"> ▷ Informer le personnel ▷ Évaluer le stock de matériel de protection disponible (solution hydro-alcoolique, masques de soins et surblouses) ▷ Gestion des stocks de médicaments ▷ Préparer des procédures organisationnelles (tenue, locaux, déchets...) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Isolement en chambre ▶ Mise en place de Mesures Additionnelles Gouttelettes (MAG) : surblouse, masque de soins et port de gants si risque de contact avec les liquides biologiques ▶ Evaluation clinique médicale ▶ Dépistage COVID-19 si critères d'infection (Cf. Critères sur le site HPCI) <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>DÉPISTAGE COVID-19</p> <pre> graph TD A[DÉPISTAGE COVID-19] --> B[TEST NÉGATIF] A --> C[TEST POSITIF] B --> D["▶ MAG si symptômes respiratoires et maintien en chambre 24h après disparition des symptômes."] C --> E["▶ Isolement en chambre individuelle si possible ▶ MAG ▶ Surveillance clinique régulière"] </pre> </div>	<p>Arrêter les dépistages systématiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>Chambre individuelle</u> (ou double en délimitant un périmètre d'isolement) pour chaque nouveau résident suspect ▶ <u>Mettre en place une organisation chronologique des soins</u> avec prise en charge des résidents sans infection CoVID-19 en premier, terminer les soins par les résidents avec une infection CoVID-19 <ul style="list-style-type: none"> ▷ MAG (Mesures Additionnelles Gouttelettes: surblouse, masque de soins et port de gants si risque de contact avec les liquides biologiques) ▷ Équipe de soins dédiée ▷ Matériel de soins dédié ▷ Surveillance clinique régulière ▶ Si nécessaire : <ul style="list-style-type: none"> ▷ Demande de renfort : évaluer le besoin en personnel supplémentaire dans les soins, protection civile, soldats sanitaires, avis équipes mobiles gériatriques, soins palliatifs et psycho-gériatriques)
Gestion des locaux, linges et déchets : filière habituelle		

FIN DE LA PÉRIODE D'ISOLEMENT

- ▶ 10 jours minimum et 48h sans symptômes ou selon accord avec l'unité HPCI.
- ▶ Décision basée sur les critères cliniques. PAS DE TEST MICROBIOLOGIQUE.
- ▶ Levées des MAG.
- ▶ Hygiène des mains.
- ▶ Distanciation sociale. Si impossible, port du masque de soins pour 1 semaine après la levée des MAG.

NB : Les visites pour le résident sont autorisées, avec encadrement et accompagnement par le personnel.