

**Fonctions concernées :** Médecins et personnel infirmier des services de soins

**PATHOGÈNES À RECHERCHER**

**SITES À PRÉLEVER (FROTTIS)**

<b>MRSA :</b> <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline	Nez + gorge+ plis inguinaux (3 frottis pouvant être poolés)
<b>VRE :</b> Entérocoque résistant à la vancomycine ( <i>E. faecium, E. faecalis</i> )	<b>Ano-rectal</b> (1 frottis, s'assurer de la présence matière fécale)
<b>ESBL :</b> Entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi, <b>CRE=EPC :</b> Entérobactéries productrices de carbapénémase	<b>Ano-rectal</b> (1 frottis, s'assurer de la présence matière fécale)
<b>Autres BMR avec carbapénémase ou autre résistance</b> (à rechercher sur avis HPCI)	<b>Ano-rectal et sites cliniques</b> (site d'insertion de cathéter, plaies, culture sécrétions endo-trachéales si intubation, culture d'urines si sonde vésicale)
<b>C. auris :</b> <i>Candida auris</i>	Nez + plis inguinaux + aisselles et sites cliniques (site d'insertion de cathéter, plaies, culture d'urines si sonde vésicale)

**MESURES À INSTAURER :**

**MAC** = Mesures Additionnelles contact; **MAG** = Mesures Additionnelles gouttelettes si infection respiratoire; **PS** = Précautions Standard

Indications au dépistage MRSA, VRE, ESBL, CRE, C. auris *	Urgences : mesures lors prise en charge	Soins Intensifs : mesures à l'admission	Unités de soins : mesures à l'admission
Tout patient hospitalisé et :	<b>MAC+/_MAG</b>	<b>MAC+/_MAG, privilégier chambre individuelle</b>	<b>MAC+/_MAG, privilégier chambre individuelle</b>
transféré d'un établissement de soins à l'étranger (hors Suisse) ou d'un établissement suisse (service) déclaré en épidémie*			
hospitalisé > 24h à l'étranger dans les 12 mois qui précèdent			
hémodialyse dans un centre étranger dans les 12 mois précédant ou dans un centre suisse déclaré en épidémie*			
en provenance d'un programme humanitaire de l'étranger			
connu comme porteur de BMR (frottis selon indication HPCI)			

\*Pour les hôpitaux suisses rechercher uniquement le germe concerné

\*\* Pour C.auris effectuer un dépistage à l'admission des patients transférés d'une unité de soins intensifs à l'étranger ou de tous les patients transférés directement d'un hôpital de l'étranger

**LORS D'ADMISSION DIRECTE EN CENTRE DE TRAITEMENT ET RÉADAPTATION (CTR) D'UN PATIENT À RISQUE, DISCUTER DU DÉPISTAGE ET DE LA PRISE EN CHARGE AVEC LE SERVICE HPCI OU L'UNITÉ CANTONALE HPCI**

**RÉSULTATS DU DÉPISTAGE**

<b>Positifs pour MRSA, ESBL non- E.coli, CRE, VRE, autre BMR</b>	<b>Négatifs</b>
Poursuivre les mesures instaurées à l'admission <b>et aviser inf. HPCI</b>	<b>Précautions Standard</b>