

Fonctions concernées : Médecins et personnel infirmier des services de soins

PATHOGÈNES À RECHERCHER

SITES À PRÉLEVER (FROTTIS)

MRSA : <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline	Nez + gorge+ plis inguinaux (3 frottis pouvant être poolés)
VRE : Entérocoque résistant à la vancomycine (<i>E. faecium</i> , <i>E. faecalis</i>)	Ano-rectal (1 frottis, s'assurer de la présence matière fécale)
ESBL : Entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi, CRE=EPC : Entérobactéries productrices de carbapénémase	Ano-rectal (1 frottis, s'assurer de la présence matière fécale)
Autres BMR avec carbapénémase ou autre résistance (à rechercher sur avis HPCI)	Ano-rectal et sites cliniques (site d'insertion de cathéter, plaies, culture sécrétions endo-trachéales si intubation, culture d'urines si sonde vésicale)
C. auris : <i>Candida auris</i>	Nez + plis inguinaux + aisselles et sites cliniques (site d'insertion de cathéter, plaies, culture d'urines si sonde vésicale)

MESURES À INSTAURER :

MAC = Mesures Additionnelles contact; **MAG** = Mesures Additionnelles gouttelettes si infection respiratoire; **PS** = Précautions Standard

Indications au dépistage MRSA, VRE, ESBL, CRE, C. auris *	Urgences : mesures lors prise en charge	Soins Intensifs : mesures à l'admission	Unités de soins : mesures à l'admission
Tout patient hospitalisé et :	MAC+/_MAG	MAC+/_MAG, privilégier chambre individuelle	MAC+/_MAG, privilégier chambre individuelle
transféré d'un établissement de soins à l'étranger (hors Suisse) ou d'un établissement suisse (service) déclaré en épidémie*			
hospitalisé > 24h à l'étranger dans les 12 mois qui précèdent			
hémodialyse dans un centre étranger dans les 12 mois précédant ou dans un centre suisse déclaré en épidémie*			
en provenance d'un programme humanitaire de l'étranger			
connu comme porteur de BMR (frottis selon indication HPCI)			

*Pour les hôpitaux suisses rechercher uniquement le germe concerné

** Pour C.auris effectuer un dépistage à l'admission des patients transférés directement d'un hôpital de l'étranger

LORS D'ADMISSION DIRECTE EN CENTRE DE TRAITEMENT ET RÉADAPTATION (CTR) D'UN PATIENT À RISQUE, DISCUTER DU DÉPISTAGE ET DE LA PRISE EN CHARGE AVEC LE SERVICE HPCI OU L'UNITÉ CANTONALE HPCI

RÉSULTATS DU DÉPISTAGE

Positifs pour MRSA, ESBL non- E.coli, CRE, VRE, autre BMR	Négatifs
Poursuivre les mesures instaurées à l'admission et aviser inf. HPCI	Précautions Standard