

## EMS - Manuel - Vaccination - résident

VACCINATION	INDICATION	VACCIN	POSOLOGIE	FREQUENCE	COMMENTAIRES
<b>Grippe</b>	Tous les résidents	<b>Fluarix®</b> , <b>Mutagrip®</b> , <b>Influvac®</b> , <b>Influvac®plus</b> , <b>Inflexal V®</b> <b>Fluarix Tetra®</b> <b>Vaxigrip Tetra®</b>	0.5ml IM (deltoïde)	<b>Vaccin annuel</b>	Une couverture de 80 % des résidents et du personnel permet d'obtenir une immunité de population (type "herd immunity")
<b>Pneumocoque</b>	Résidents avec risque d'infections ou de complications d'infections pneumococciques (maladies pulmonaires chroniques, insuffisance cardiaque sévère, diabète, insuffisance rénale, abus d'alcool)	<b>Prevenar®13</b>	0.5ml IM (deltoïde) ou s/cut	<b>1 dose</b>	Lorsque le status vaccinal n'est pas connu, il est recommandé de vacciner le résident à l'admission et d'inscrire la date de la vaccination dans le dossier
<b>Diphtérie/ Tétanos</b>	Tous les résidents  En présence de plaie ouverte exposée avec vaccination ou rappel anti-tétanique de > de 10 ans	<b>Ditanrix®</b> <b>Anatoxal DiTe®N</b>	0.5ml IM (deltoïde)	<b>3 doses:</b> 1 dose j0, 1 dose j60 et 1 dose entre j180 - j360 <u>puis</u> 1 dose rappel tous les 10 ans  1 dose de rappel	<b>Vaccin combiné diphtérie tétanos</b> Peut être utilisé pour l'immunisation active et pour les rappels
<b>Tétanos seul</b>	En présence de plaie ouverte exposée avec vaccination ou rappel anti-tétanique de >de 5 ans et de <10 ans	<b>Anatoxal Te®N</b>	0.5ml IM (deltoïde)	<b>1 dose</b>	
<b>Hépatite A</b>	Résident avec infection à HIV, HBV ou HCV	<b>Havrix® 1440</b>	1.0ml IM (deltoïde)	<b>2 doses:</b> 1 dose j0 et 1 dose entre j180 - j360	