

Tableau synthétique des Mesures Additionnelles aux Précautions Standard (PS) - Unités somatiques

	CONTACT 	CONTACT <i>C.difficile</i> 	CONTACT <i>Norovirus</i> 	CONTACT Gale 	GOUTTELETTES 	AEROSOL 	AEROSOL + CONTACT 
Exemples	MRSA, VRE, ESBL, carbapénémase (EPC), <i>Pseudomonas</i> / <i>Acinetobacter</i> multiR		Mesures Gouttelettes si vomissements		Grippe, COVID, autres virus resp., inf. resp. à MRSA, VRE, ESBL, carbapénémase, <i>Pseudomonas</i> multi-R	Tuberculose pulmonaire bacillaire, rougeole	VZV : Varicelle, zona disséminé
Placement du/de la patient-e	Chambre individuelle ou de cohortage, isolement géographique possible en chambre à 2 lits si MRSA / ESBL	Chambre individuelle ou de cohortage	Chambre individuelle ou de cohortage	Chambre individuelle ou de cohortage	Chambre individuelle ou de cohortage	Chambre individuelle, avec sas et pression négative	Chambre individuelle
Signalétique sur la porte de la chambre	Affiche A3 STOP, et A4 entrée/sortie	Affiche A3 STOP, et A4 entrée/sortie	Affiche A3 STOP, et A4 entrée/sortie	Affiche A3 STOP, et A4 entrée/sortie	Affiche A3 STOP, et A4 entrée/sortie	Affiche A3 STOP, et A4 entrée/sortie	Affiche A3 STOP, et A4 entrée/sortie
Equipement de protection : statif isolement devant la porte							
• Masque	NON, masque de soins selon PS	NON, masque de soins selon PS	NON, masque de soins selon PS, en particulier si vomissements	NON, masque de soins selon PS	OUI, masque de soins Virus resp. : masque FFP2 lors de procédures générant des aérosols	OUI, masque FFP2	VZV : masque FFP2 pour le personnel non immun, sinon selon PS
• Lunettes de protection, masque à visière *	NON, selon PS	NON, selon PS	NON, selon PS	NON, selon PS	NON, selon PS	NON, selon PS	NON, selon PS
• Sur-blouse *	OUI, si contact direct	OUI, si contact direct	OUI, si contact direct	OUI, si contact direct	OUI, si contact direct	NON, selon PS	OUI, si contact direct
Hygiène des mains : selon les 5 indications de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique. Si <i>C.difficile</i> ou gale : lavage des mains à l'eau et au savon puis désinfection avant de sortir de la chambre							
• Gants *	NON, selon PS	OUI pour tout contact avec le patient et son environnement	NON, selon PS	OUI pour tout contact avec le patient et son environnement	NON, selon PS	NON, selon PS	NON, selon PS
Matériel : privilégier du matériel à usage unique ou matériel dédié							
Nettoyages/désinfection							
• Environnement direct	Désinfection 1x/j avec Incidin® Plus	Désinfection 1x/j avec Tristel Fuse® Surfaces	Désinfection 1x/j avec Tristel Fuse® Surfaces	Désinfection 1x/j avec Incidin® Plus	Désinfection 1x/j avec Incidin® Plus	Désinfection 1x/j avec Incidin® Plus	Désinfection 1x/j avec Incidin® Plus
• Sanitaires	Désinfection 1x/j avec Incidin® Plus	Désinfection 1x/j avec Tristel Fuse® Surfaces	Désinfection 1x/j avec Tristel Fuse® Surfaces 2x/j si épidémie	Désinfection 1x/j avec Incidin® Plus	Désinfection 1x/j avec Incidin® Plus	Désinfection 1x/j avec Incidin® Plus	Désinfection 1x/j avec Incidin® Plus
Transport pour examens/transfert : changement de la literie, chemise de nuit propre et désinfection des mains avant la sortie, surblouse (et gants) pas nécessaire(s) pour le patient, désinfection du pourtour du lit et des accessoires (pompes à perfusion, chaise roulante) avant de sortir de la chambre, surblouse (et gants) pas nécessaire(s) pour le transporteur							
					Masque de soins pour le patient et pour le transporteur	Masque de soins pour le patient et FFP2 pour le transporteur	Masque de soins pour le patient, FFP2 pour le personnel non immun
Sorties hors de la chambre : sorties limitées aux besoins essentiels et accompagnées d'un soignant, chemise de nuit propre et désinfection des mains avant la sortie. Désinfecter le matériel touché par le patient hors de la chambre, surblouse (et gants si indiqués) pour le soignant seulement si contact direct avec le patient							
					Masque de soins pour le patient et pour le soignant	Pas de sorties	Masque de soins pour le patient
Au départ du patient : nettoyage et désinfection de la chambre par le service propreté et hygiène (sortie d'isolement) **							
• Changement du rideau de lit	OUI, au départ du patient	OUI, à la levée de l'isolement	OUI, à la levée de l'isolement	OUI, au départ du patient	Pas nécessaire pour grippe, COVID, virus respiratoires	Seulement si souillures	Seulement si souillures

* PAS nécessaire pour les visiteurs-euses, hormis si participation aux soins

** Sortie MA Aérosol : attendre 1h avant de nettoyer la chambre

Références : guides romands [Précautions Standard](#) et [Mesures Additionnelles](#), www.hpci.ch