

Indications au dépistage des bactéries multirésistantes (BMR) et *Candida auris* à l'admission pour le Département de psychiatrie

Le portage de BMR et de *C. auris* est le plus souvent asymptomatique, raison pour laquelle un dépistage doit être effectué à l'admission chez les patients à risque.

		Bactéries multirésistantes (BMR)							
		MRSA	VRE	ESBL	Carbapénémase	<i>Candida auris</i>			
		<i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline	<i>Enterococcus faecium</i> (ou <i>E. faecalis</i>) résistant à la vancomycine	Entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi	Bactéries productrices de carbapénémase <ul style="list-style-type: none"> Entérobactéries <i>Pseudomonas</i> <i>Acinetobacter</i> 				
		Frottis nez, gorge, aine *	Frottis rectal avec matériel fécal visible ou de selles *	Frottis rectal avec matériel fécal visible ou de selles *	Frottis rectal avec matériel fécal visible ou de selles *	Frottis aisselles, aines Même écouvillon *			
Indications aux dépistages	Transfert depuis un établissement de soins étranger (hôpital, EMS, CTR)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Précautions Standard Chambre individuelle jusqu'aux résultats des BMR	Mesures à mettre en place	
	Hospitalisation (>12h) à l'étranger au cours des 12 derniers mois	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI			
	Dialysé ou traitement ambulatoire régulier au cours des 12 derniers mois dans un hôpital étranger	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI			
	Patient connu dans ALGERME	Selon message ALGERME, recherche du portage du micro-organisme ciblé							Selon message ALGERME
	Patient identifié « patient contact » dans ALGERME	Selon message ALGERME, recherche du portage du micro-organisme ciblé							

Envoyer les prélèvements au Laboratoire d'épidémiologie du CHUV par la poste ou transport interne du lundi au jeudi. Les prélèvements doivent être acheminés dans les 48h après le prélèvement.

* Se référer au catalogue des analyses et examens sur Tribu : [Laboratoires](#) | [CHUV EXAMENS](#)