

## Gestion du linge

## Manipulation du linge dans les unités de soins

## Linge propre

- Se désinfecter les mains avant toute manipulation de linge propre
- Stocker le linge dans un lieu fermé sec, à l'abri du flux des personnes et de la poussière
- Limiter dans l'unité, le stock de linge à une quantité nécessaire prédéterminée

## Linge sale

Type de linge sale	Mode d'évacuation	Remarques
Linge plat (drap, linge de bain etc)	Sac à linge	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Toujours utiliser des gants lors de manipulation de <u>linge souillé</u> avec des <u>liquides ou matières biologiques</u></li> </ul>
Duvet/ oreiller	Sac à linge séparé Identifier le sac selon organisation interne	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Dégrossir à sec le linge souillé dans l'unité</b> (à l'aide de serviette en papier absorbante)</li> <li>➤ <b>Collecter séparément le linge fortement souillé par des liquides biologiques dans un petit sac transparent</b>, le fermer et le déposer dans le sac à linge habituel, après l'avoir dégrossi à sec</li> <li>➤ <u>Ne jamais rincer du linge dans les unités</u></li> <li>➤ Se <u>désinfecter les mains</u> après toute manipulation de linge sale et après retrait des gants</li> <li>➤ Eviter que du linge sale entre en contact avec les vêtements, le linge propre, les patients et l'environnement</li> <li>➤ Ne pas poser le linge au sol</li> </ul>
Linge patient	Sac à linge séparé Identifier le sac selon organisation interne	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Déposer le plus rapidement possible le linge sale dans le sac servant à son transport</li> <li>➤ Ne pas transvaser de linge d'un sac à un autre</li> <li>➤ Ne pas remplir les sacs à linge sale au delà des 2/3 de leur capacité</li> <li>➤ En cas de souillures, nettoyer avec un détergent/désinfectant l'extérieur des sacs de linge sale</li> <li>➤ Ne pas laisser traîner des sacs à linge ouverts et bien fermer les sacs avant leur transport</li> <li>➤ Les sacs à linge sont stockés dans le local sale</li> <li>➤ Ne jamais traîner les sacs de linge sale sur le sol mais effectuer leur transport interne dans des chariots/containers strictement réservés à cet usage</li> </ul>

**Il n'est pas nécessaire de prévoir une filière spécifique pour le linge des patients avec des Mesures Additionnelles, sauf avis contraire du responsable HPCI (Ex: gale, pédiculose, épidémie de Norovirus).**

## Manipulation du linge dans les buanderies internes

## Linge propre

- Planifier des circuits propres et sales afin d'éviter tout croisement du linge
- Port de matériel de protection (gants, blouse) lors de toute manipulation de linge sale
- Ne pas passer d'une zone sale à une zone propre avec du matériel de protection
- **Se laver les mains ou se désinfecter les mains avant de manipuler du linge propre**

## Linge sale

Type de linge sale	Mode de traitement	Remarques
Linge plat (drap, linge de bain etc)	<b>Lavage en machine à une T° ≥ à 60°</b>  Il est recommandé d'ajouter un désinfectant (oxygène actif,..) au produit de lessive lorsque le linge doit être traité à une T° < à 60°C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'entreposage et le tri éventuel du linge sale doivent être effectués dans la zone sale</li> <li>• <u>Trier le linge avec des gants, une surblouse ou tablier et un masque.</u></li> <li>• <b>Le linge qui est contenu dans un double emballage (petit sac transparent) ne doit pas être manipulé (pas de tri). Son contenu sera directement mis en machine.</b></li> <li>• <b>Le linge souillé ne doit pas être rincé ni trempé avant d'être mis en machine</b></li> <li>• Les gants, la surblouse ou le tablier, le masque et les lunettes de protection seront éliminés dès la fin du tri.</li> <li>• <u>Se laver ou se désinfecter les mains après toute manipulation de linge sale, après retrait des gants et avant de toucher au linge propre.</u></li> <li>• Le lavage à sec doit être strictement réservé aux vêtements ne supportant pas un autre traitement.</li> <li>• Le séchage et le repassage assurent également un effet microbicide sur la plupart des germes. Il n'est donc pas nécessaire de traiter à part le linge provenant d'un isolement infectieux</li> <li>• Nettoyer avec un produit détergent les moyens de transport (chariot, containers, etc.) après la livraison</li> </ul>
Duvet/ oreiller		
Linge patient	<b>Lavage en machine à une T° ≥ à 60°</b>  Une température de 40° permet d'éliminer la grande majorité des micro-organismes. <u>En cas de linge souillé devant être traité à T° &lt; à 60°C il est recommandé d'ajouter un désinfectant (ex. oxygène actif) au produit de lessive</u>	