



Mesures Additionnelles Aérosol dans les secteurs ambulatoires de pédiatrie

Mesures additionnelles		Précautions Standard
Type d'activité	 Mesures Additionnelles AEROSOL (varicelle, rougeole, tuberculose)	Types de structures Policliniques PED1+J, PONJ et CHP1+J
Mise en place des mesures additionnelles	<p><u>Varicelle active</u> : dès l'apparition des vésicules et jusqu'à guérison clinique.</p> <p><u>Contact varicelle</u> : du 10^{ème} jour après la 1^{ère} exposition au 21^{ème} jour après la dernière exposition, respectivement 28^{ème} jour si administration d'immunoglobulines.</p> <p><u>Rougeole</u> : pendant 4 jours à partir du début de l'exanthème.</p> <p><u>Contact rougeole</u> : du 6^{ème} jour après la 1^{er} exposition au 21^{ème} jour après la dernière exposition.</p> <p><u>Tuberculose pulmonaire suspectée ou confirmée</u>: sur avis de l'unité d'hygiène hospitalière.</p>	
Accueil du patient par le personnel	<p>Prévoir la venue de l'enfant en fin de programme.</p> <p style="background-color: #0000FF; color: white;">L'enfant porte un masque FFP2 pour circuler dans l'hôpital, si pas possible masque de soins (arrivée et départ).</p> <p style="background-color: #0000FF; color: white;">L'enfant ne séjourne pas en salle d'attente ou dans les autres lieux communs.</p> <p>A son arrivée, l'enfant est placé immédiatement en box de consultation ou chambre individuelle (si possible avec sas et pression négative).</p> <p>Maintenir portes et fenêtres fermées pour éviter les courants d'air.</p> <p>Tuberculose pulmonaire active : demander à l'enfant de tousser dans un mouchoir jetable.</p>	
Accompagnants privés	<p>Limiter le nombre d'accompagnants privés.</p> <p>Pas de tenue de protection pour les accompagnants privés. Désinfection des mains à la sortie du box de consultation ou de la chambre individuelle.</p> <p>Pas de circulation dans les services hospitaliers pour les accompagnants privés.</p> <p style="background-color: #0000FF; color: white;"><u>Varicelle</u> : s'assurer de l'immunité des accompagnants. Si pas d'immunité, port d'un masque FFP 2 pour circuler dans l'hôpital pendant la phase potentielle d'incubation (du 10^{ème} jour après la 1^{ère} exposition au 21^{ème} jour après la dernière exposition, respectivement 28^{ème} jour si administration d'immunoglobulines). Si développement d'une varicelle, ne pas accompagner l'enfant à l'hôpital.</p> <p style="background-color: #0000FF; color: white;"><u>Rougeole</u> : s'assurer de l'immunité des accompagnants. Si pas d'immunité, port d'un masque FFP2 pour circuler dans l'hôpital pendant la phase potentielle d'incubation (du 6^{ème} jour après la 1^{ère} exposition au 21^{ème} jour après la dernière exposition). Si développement d'une rougeole, ne pas accompagner l'enfant à l'hôpital.</p> <p>Tuberculose: sur avis de l'unité d'hygiène hospitalière.</p>	

Mesures additionnelles		Précautions Standard
Type d'activité	 Mesures Additionnelles AEROSOL (varicelle, rougeole, tuberculose)	Types de structures Policliniques PED1+J, PONJ et CHP1+J
Transfert du patient pour mesures diagnostique, thérapeutique...	Avertir le service et/ou l'institution destinataire avant le transfert du patient.	
	Mettre un masque FFP2 à l'enfant, si pas possible un masque médical.	
	Accompagnant privé: pas de tenue de protection. Désinfection des mains à la sortie du box de consultation ou de la chambre individuelle.	
	Transporteur : pas de tenue de protection.	
Tenue de protection pour le personnel	Personne non immune : mettre un masque FFP2 avant la prise en charge de l'enfant ou avant d'entrer dans le box de consultation ou la chambre individuelle, enlever le masque FFP2 une fois l'enfant parti ou après être sorti du box de consultation ou de la chambre individuelle.	
	Prise en charge d'un enfant avec varicelle active (présence de vésicules) : blouse de protection.	
Gestion du matériel	Limitier au strict minimum le stock de matériel dans le box de consultation ou la chambre individuelle.	
	Privilégier le matériel à usage unique.	
	Désinfecter le matériel à usage multiple après utilisation ou au départ de l'enfant.	
Entretien de l'environnement	<p>Avant de débiter l'entretien de l'environnement, aérer le box de consultation ou la chambre individuelle pendant 1 heure puis :</p> <p><u>Personnel de soins</u></p> <p>Désinfecter les surfaces de l'environnement avec lesquels le patient a été en contact dans le box de consultation.</p> <p>Désinfecter le mobilier, les appareils et toutes autres surfaces de l'environnement avec lesquels le patient a été en contact en chambre individuelle.</p> <p><u>Service Propreté et Hygiène</u></p> <p>Si installation en box de consultation, nettoyage standard du box par le service Hygiène et Propreté en fin de journée.</p> <p>Si installation en chambre individuelle, changement du rideau entourant le lit et nettoyage standard de la chambre par le service Hygiène et Propreté au départ de l'enfant.</p>	
Gestion du linge	Utiliser des draps en papier à usage unique dans les box de consultation.	
	Placer le linge de lit ou les vêtements de corps dans les sacs à linge habituels.	
Gestion des déchets	Se référer au document de l'OFEFP (voir tableau définitions).	